

# がん化学療法レジメン

(研): 臨床研究、(患)患者限定  
2022年4月更新

## 消化器

[ 大腸癌 ] [ 食道癌 ] [ 胃癌 ] [ 膵臓癌 ] [ 胆道癌 ] [ 肝細胞癌 ]

### 大腸癌

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
CPT-11+Cmab	アービタックス	セツキシマブ	250 mg/m <sup>2</sup> (初回 400mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注 60 分 初回 2 時間	d1,8	14 日	大腸癌
	トポテシン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1		
CPT-11+Pmab	ベクティビックス	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注 60 分	d1	14 日	大腸癌
	トポテシン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1		
CPT-11 単剤	トポテシン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1	14 日	大腸癌
Cmab 単剤	アービタックス	セツキシマブ	250 mg/m <sup>2</sup> (初回 400mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注 60 分 初回 2 時間	d1	7 日	大腸癌
Pmab 単剤	ベクティビックス	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注 60 分	d1	14 日	大腸癌
FOLFOXIRI	トポテシン	イリノテカン	165 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1	14 日	大腸癌
	エルプラット	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	アイソボリン	レボホリナート Ca	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	3000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 48 時間	d1		
FOLFOXIRI+BV	アバスチン	ベバシツマブ	5 mg/kg	点滴静注 30 分 (初回 90 分) (2 回目 60 分)	d1	14 日	大腸癌
	トポテシン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup> (max 165 mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注 90 分	d1		
	エルプラット	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	アイソボリン	レボホリナート Ca	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	3000 mg/m <sup>2</sup> (max 3200 mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注 48 時間	d1		
FOLFIRI	トポテシン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1	14 日	大腸癌
	アイソボリン	レボホリナート Ca	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		

	5-FU	5-フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	急速静注	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46 時間	d1		
<u>FOLFIRI+BV</u>	アバスタチン	ベバシツマブ	5 mg/kg	点滴静注 30 分 (初回 90 分) (2 回目 60 分)	d1	14 日	大腸癌
	トポテシン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1		
	アイソボリン	レボホリナート Ca	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	急速静注	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46 時間	d1		
<u>FOLFIRI+Cmab</u>	アービタックス	セツキシマブ	250 mg/m <sup>2</sup> (初回 400mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注 60 分 初回 2 時間	d1,8	14 日	大腸癌
	トポテシン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1		
	アイソボリン	レボホリナート Ca	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	急速静注	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46 時間	d1		
<u>FOLFIRI+Pmab</u>	ベクティビックス	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注 60 分	d1	14 日	大腸癌
	トポテシン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1		
	アイソボリン	レボホリナート Ca	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	急速静注	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46 時間	d1		
<u>FOLFIRI+RAM</u>	サイラムザ	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注 1 時間	d1	14 日	大腸癌
	トポテシン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1		
	アイソボリン	レボホリナート Ca	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	急速静注	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46 時間	d1		
<u>FOLFIRI+AFL</u>	ザルトラップ	アフリベルセプト	4 mg/kg	点滴静注 1 時間	d1	14 日	大腸癌
	トポテシン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1		
	アイソボリン	レボホリナート Ca	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	急速静注	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46 時間	d1		

<u>IRIS</u>	トポテシン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1	21 日	大腸癌
	ティーエスワン	テガフル ギメラシル オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /day	1 日 2 回 朝夕食後	d1-14		
<u>IRIS+BV</u>	アバスチン	ベバシツマブ	7.5 mg/kg	点滴静注 30 分 (初回 90 分) (2 回目 60 分)	d1	21 日	大腸癌
	トポテシン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1		
	ティーエスワン	テガフル ギメラシル オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /day	1 日 2 回 朝夕食後	d1-14		
<u>SOX(130)</u>	エルプラット	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1	21 日	大腸癌
	ティーエスワン	テガフル ギメラシル オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /day	1 日 2 回 朝夕食後	d1-14		
<u>SOX(130)+BV</u>	アバスチン	ベバシツマブ	7.5 mg/kg	点滴静注 30 分 (初回 90 分) (2 回目 60 分)	d1	21 日	大腸癌
	エルプラット	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	ティーエスワン	テガフル ギメラシル オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /day	1 日 2 回 朝夕食後	d1-14		
<u>XELOX</u>	エルプラット	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1	21 日	大腸癌
	ゼローダ	カペシタビン	2000 mg/m <sup>2</sup> /day	1 日 2 回 朝夕食後	d1-14		
<u>XELOX+BV</u>	アバスチン	ベバシツマブ	7.5 mg/kg	点滴静注 30 分 (初回 90 分) (2 回目 60 分)	d1	21 日	大腸癌
	エルプラット	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	ゼローダ	カペシタビン	2000 mg/m <sup>2</sup> /day	1 日 2 回 朝夕食後	d1-14		
<u>Cape+ BV</u>	アバスチン	ベバシツマブ	7.5 mg/kg	点滴静注 30 分 (初回 90 分) (2 回目 60 分)	d1	21 日	大腸癌
	ゼローダ	カペシタビン	2000 mg/m <sup>2</sup> /day	1 日 2 回 朝夕食後	d1-14		
<u>XELOX+Cmab</u>	アービタックス	セツキシマブ	250 mg/m <sup>2</sup> (初回 400mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注 60 分 初回 2 時間	d1,8,15	21 日	大腸癌
	エルプラット	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	ゼローダ	カペシタビン	2000 mg/m <sup>2</sup> /day	1 日 2 回 朝夕食後	d1-14		

mFOLFOX6	エルプラット	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1	14 日	大腸癌
	アイソボリン	レボホリナート Ca	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	急速静注	d1		小腸癌
	5-FU	5-フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46 時間	d1		
mFOLFOX6+BV	アバステン	ベバシツマブ	5 mg/kg	点滴静注 30 分 (初回 90 分) (2 回目 60 分)	d1	14 日	大腸癌
	エルプラット	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	アイソボリン	レボホリナート Ca	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	急速静注	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46 時間	d1		
mFOLFOX6+Cmab	アービタックス	セツキシマブ	250 mg/m <sup>2</sup> (初回 400mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注 60 分 初回 2 時間	d1,8	14 日	大腸癌
	エルプラット	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	アイソボリン	レボホリナート Ca	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	急速静注	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46 時間	d1		
mFOLFOX6+Pmab	ベクティビックス	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注 60 分	d1	14 日	大腸癌
	エルプラット	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	アイソボリン	レボホリナート Ca	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	急速静注	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46 時間	d1		
FLOX	エルプラット	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1,15,29	56 日	大腸癌術後補助 化学療法
	アイソボリン	レボホリナート Ca	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1,8,15,22,29,36		
	5-FU	5-フルオロウラシル	500 mg/m <sup>2</sup>	急速静注	d1,8,15,22,29,36		
RPMI+BV	アバステン	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注 30 分 (初回 90 分) (2 回目 60 分)	d1	14 日	大腸癌
	アイソボリン	レボホリナート Ca	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1,8		
	5-FU	5-フルオロウラシル	500 mg/m <sup>2</sup>	急速静注	d1,8		
MMC/5-FU	5-FU	フルオロウラシル	1000mg/m <sup>2</sup>	24h	d1-4	28 日	肛門管がん

	マイトマイシン	マイトマイシン	10 mg/m <sup>2</sup>	全開	d1		
<u>Nivolumab</u>	オブジーボ	ニボルマブ	240mg	30分	d1	14日	MSIhigh 大腸癌
<u>TAS+BV</u>	アバスタチン	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 60分)	d1,15	28日	大腸癌
	ロンサーフ	トリフルリジン・チピラシル	70mg/m <sup>2</sup>	1日2回内服	d1-5,d8-12		
Nivo+Ipi(RCC)併用療法	オブジーボ	ニボルマブ	240mg	30min	d1	1~4コース 21日 5コース目以降 14日	大腸癌 (MSI-high)
	ヤーボイ	イピリムマブ	1mg/kg	30min	d1(4コースまで)		
<u>Cmab+BRAF+MEK</u>	アービタックス	セツキシマブ	250mg/m <sup>2</sup> *	60分*	d1	7日	大腸癌
	ビラフビ	エンコラフェニブ	300mg/body	1日1回	連日		
	メクトビ	ビニメチニブ	90mg/body	1日2回	連日		
<u>RPMI</u>	アイソボリン	レボホリナート Ca	250 mg/m <sup>2</sup>	2時間	d1,8,15,22,29,36	56日	大腸癌、胃がん
	5-FU	5-フルオロウラシル	600 mg/m <sup>2</sup>	全開	d1,8,15,22,29,36		
<u>HER+PER</u>	パージェタ	ペルツズマブ	420 mg/body (初回 840 mg/body)	点滴静注 30分 (初回 60分)	d1	21日	大腸癌
	ハーセプチン	トラスツズマブ	6mg/kg (初回 8mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1		

[消化器へ戻る](#)

[Topへ戻る](#)

## 食道癌

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
DCF	ドセタキセル	ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1	28日	食道癌
	ランダ	シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24時間	d1-5		
<u>FP(800/80)</u>	ランダ	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1	28日 (術前:21日)	食道癌
	5-FU	5-フルオロウラシル	800 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24時間	d1-5		
FU+CDGP	アクプラ	ネダプラチン	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	d1	28日	食道癌
	5-FU	5-フルオロウラシル	800 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24時間	d1-5		

FP(700/70)+RT	ランダ	シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1	28 日	食道癌
	5-FU	5-フルオロウラシル	700 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1-4		
DOC(70)	ドセタキセル	ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1	21 日	食道癌
wPTX(100)食道	パクリタキセル	パクリタキセル	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1,8,15,22,29,36	49 日	食道癌
mFOLFOX6	エルプラット	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1	14 日	食道癌
	アイソボリン	レボホリナート Ca	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	急速静注	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46 時間	d1		
Nivolumab	オプジーボ	ニボルマブ	240mg	30 分	d1	14 日	食道癌
Pembrolizumab	キイトルーダ	ペンブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30 分	d1	21 日	食道癌

[消化器へ戻る](#)

[Top へ戻る](#)

## 胃癌

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
HXP	ハーセプチン	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回 8mg/kg)	点滴静注 30 分 (初回 90 分)	d1	21 日	胃癌
	ランダ	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	ゼローダ	カペシタビン	2000 mg/m <sup>2</sup> /day	1 日 2 回朝夕食後	d1-14		
FP+HER	ハーセプチン	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回 8mg/kg)	点滴静注 30 分 (初回 90 分)	d1	21 日	胃癌
	ランダ	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	800 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1-5		
XELOX+HER	ハーセプチン	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回 8mg/kg)	点滴静注 30 分 (初回 90 分)	d1	21 日	胃癌
	エルプラット	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	ゼローダ	カペシタビン	2000 mg/m <sup>2</sup> /day	1 日 2 回朝夕食後	d1-14		
SOX 130+Tmab	ハーセプチン	トラスツズマブ	6 mg/kg (初回 8mg/kg)	点滴静注 30 分 (初回 90 分)	d1	21 日	胃癌

	エルプラット	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
	ティーエスワン	テガフル ギメラシル オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /day	1 日 2 回 朝夕食後	d1-21		
<u>XEL+CDDP(80)</u>	ランダ	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1	21 日	胃癌
	ゼローダ	カペシタビン	2000 mg/m <sup>2</sup> /day	1 日 2 回朝夕食後	d1-14		
<u>S1+CDDP(60)</u>	ランダ	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d8	35 日	胃癌
	ティーエスワン	テガフル ギメラシル オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /day	1 日 2 回 朝夕食後	d1-21		
<u>S1(2 投 1 休)+CDDP(60)</u>	ランダ	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d8	21 日	胃癌
	ティーエスワン	テガフル ギメラシル オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /day	1 日 2 回 朝夕食後	d1-14		
<u>SOX 100</u>	エルプラット	オキサリプラチン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1	21 日	胃癌
	ティーエスワン	テガフル ギメラシル オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /day	1 日 2 回 朝夕食後	d1-14		
<u>XELOX</u>	エルプラット	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1	21 日	胃癌
	ゼローダ	カペシタビン	2000 mg/m <sup>2</sup> /day	1 日 2 回 朝夕食後	d1-14		
<u>wPAC80+RAM</u>	サイラムザ	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注 1 時間	d1,15	28 日	胃癌
	パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1,8,15		
<u>IRIS</u>	トポテシン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1	21 日	胃癌
	ティーエスワン	テガフル ギメラシル オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /day	1 日 2 回 朝夕食後	d1-14		
<u>DTX+S1</u>	ドセタキセル	ドセタキセル	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1	21 日	胃癌
	ティーエスワン	テガフル ギメラシル オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /day	1 日 2 回 朝夕食後	d1-14		
<u>nab-PTX</u>	アブラキサン	パクリタキセル	260 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1	21 日	胃癌
<u>weekly-nab-PTX</u>	アブラキサン	パクリタキセル	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8,15	21 日	胃癌
<u>wPTX(80)胃</u>	パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1,8,15	28 日	胃癌
<u>DOC(60)胃</u>	ドセタキセル	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1	21 日	胃癌

<u>CPT-11</u>	トポテシン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1	14 日	胃癌
<u>RAM</u>	サイラムザ	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注 1 時間	d1	14 日	胃癌
<u>Nivolumab</u>	オプジーボ	ニボルマブ	240mg	30 分	d1	14 日	胃癌
<u>nabPTX+RAM</u>	サイラムザ	ラムシルマブ	8 mg/kg	1 時間	d1,15	28 日	胃癌
	アブラキサン	アブラキサン	100 mg/m <sup>2</sup>	30 分	d1,8,15		
<u>T-DXd</u>	エンハーツ	T-DXd	6.4 mg/kg	90 分*	d1	21 日	胃がん
<u>CAPEOX+Nivo</u>	エルプラット	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	2 時間	d1	21 日	胃癌
	ゼロダ	カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /日	1 日 2 回内服	d1-d14		
	オプジーボ	ニボルマブ	360mg/body	30 分	d1		
<u>SOX 130+Nivo</u>	オプジーボ	ニボルマブ	360mg/body	30 分	d1	21 日	胃癌
	エルプラット	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	120 分	d1		
	エスワンタイホウ	S1	80mg/m <sup>2</sup> /日	1 日 2 回	d1-14		

[消化器へ戻る](#)

[Top へ戻る](#)

## 膵臓癌

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
<u>GEM+nabPTX weekly</u>	アブラキサン	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8,15	28 日	膵臓癌
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8,15		
<u>FOLFIRINOX</u>	エルプラット	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1	14 日	膵臓癌
	トポテシン	イリノテカン	180 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1		
	アイソボリン	レボホリナート Ca	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	急速静注	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46 時間	d1		
<u>GEM+TAR</u>	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8,15	28 日	膵臓癌
	タルセバ	エルロチニブ	100 mg/body/day	1 日 1 回空腹時	d1-28		
<u>S1+GEM</u>	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8	21 日	膵臓癌
	ティーエスワン	テガフル	80 mg/m <sup>2</sup> /day	1 日 2 回 朝夕食後	d1-14		



		ギメラシル オテラシル					
<u>GEM 単剤</u>	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8,15	28 日	膵臓癌
<u>CPT-11 単剤 (FOLFIRINOX)</u>	トポテシン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1	14 日	膵臓癌
<u>SOXIRI</u>	エルプラット	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1	14 日	膵臓癌
	トポテシン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1		
	エスワンタイホウ	S1	80 mg/m <sup>2</sup>	朝夕食後	d2,4,6,8,10,12,14		
<u>mFOLFIRINOX</u>	エルプラット	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1	14 日	膵臓癌
	トポテシン	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1		
	アイソボリン	レボホリナート Ca	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1		
	5-FU	5-フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 46 時間	d1		
<u>FOLFNaI-IRI</u>	オニバイド	リポソーム化イリノ テカン	70 mg/m <sup>2</sup>	90 分	d1	14 日	膵臓癌
	ロイコボリン	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	30 分	d1		
	5-FU	5-FU	2400 mg/m <sup>2</sup>	46 時間	d1		

[Top へ戻る](#)

## 胆道癌

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
<u>GEM+CDDP</u>	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8	21 日	胆道癌
	ランダ	シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1,8		
<u>GEM 単剤</u>	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8,15	28 日	胆道癌
GCS	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	30 分	d1	14 日	胆道癌
	ランダ	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	1 時間	d1		
	エスワンタイホウ	S-1	80mg/2		d1~d7		

[Top へ戻る](#)

## 肝細胞癌

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
RAM	サイラムザ	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注 1時間	d1	14日	肝細胞癌
Atezo+Bev	テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg/body	初回 60分 2回目以降 30分	d1	21日	肝細胞癌
	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	初回 90分 2回目 60分 以後 30分	d1		
CDDP 肝動注	アイエーコール			肝動注 20-40分	d1-	28-42日	肝細胞癌

消化器へ戻る

Top へ戻る

## 血液内科

[ ホジキンリンパ腫 ] [ 非ホジキンリンパ腫 ] [ ALL ] [ AML ] [ APL ] [ 自家移植 ] [ 同種移植 ] [ 骨髄腫 ] [ 骨髄異形成症候群 ]

### 《Hodgkin's》

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
ABVd	エクザール	ビンブラスチン	6 mg/m <sup>2</sup>	静注 1分	d1,15	28日	ホジキンリンパ腫
	アドリアシン	ドキシソルビシン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,15		
	ブレオ	ブレオマイシン	9 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,15		
	ダカルバジン	ダカルバジン	250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,15		
ABVD	エクザール	ビンブラスチン	6 mg/m <sup>2</sup>	静注 1分	d1,15	28日	ホジキンリンパ腫
	アドリアシン	ドキシソルビシン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,15		
	ブレオ	ブレオマイシン	10 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,15		
	ダカルバジン	ダカルバジン	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,15		
Nivolumab	オブジーボ	ニボルマブ	240mg	30分	d1	14日	古典的ホジキンリンパ腫 再発難治
アドセトリス療法	アドセトリス	ブレンツキシマブ ベドチン	1.8 mg/kg	点滴静注 30分	d1	21日	再発・難治性の CD30 陽性 ホジキンリンパ腫

							未分化大細胞リンパ腫
Pembrolizumab	キイトルーダ	ペンブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	d1	21日	ホジキンリンパ腫
A+AVD	エクザール	ビンブラスチン	6 mg/m <sup>2</sup>	全開	d1,15	21日	ホジキンリンパ腫
	アドリアシン	ドキシソルビシン	25 mg/m <sup>2</sup>	30分	d1,15		
	ダカルバジン	ダカルバジン	375 mg/m <sup>2</sup>	30分	d1,15		
	アドセトリス	ブレンツキシマブ ベドテン	1.2mg/kg	30分	d1,15		

[Top へ戻る](#)

## 《Non-Hodgkin's》

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
BR	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 4-8hr	d1	21日 (8コース)	非ホジキンリンパ腫 (未治療低悪性度 B 細胞性 NHL、マ ントル細胞リンパ腫)
	トレアキシ	ベンダムスチン	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d2,3 (2コース目以降 d1,2)		
R-CHOP R-CHOP(rapid)	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 4-8 時間	d1	21日	非ホジキンリンパ腫
	オンコビン	ビンクリスチン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	全開	d1		
	アドリアシン	ドキシソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	全開	d1		
	エンドキサン	シクロホスファミド	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1		
	プレドニン	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分 または 内服	d1-5		
R-mini-CHOP	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 4-8 時間	d1	21日	非ホジキンリンパ腫
	オンコビン	ビンクリスチン	1 mg/body	全開	d1		
	アドリアシン	ドキシソルビシン	25 mg/m <sup>2</sup>	全開	d1		
	エンドキサン	シクロホスファミド	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1		
	プレドニン	プレドニゾロン	40 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-5		
CHOEP	オンコビン	ビンクリスチン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	全開	d1	21日	非ホジキンリンパ腫
	アドリアシン	ドキシソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1		
	エンドキサン	シクロホスファミド	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1		
	プレドニン	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	または 内服	d1-5		
	ベプシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1-3		

R2	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 4-8 時間	d1	28 日	濾胞性リンパ腫、辺縁帯リンパ腫
	レブラミド	レナリドミド	20mg/body	p.o.	d1-21		
R-THP-COP	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 4-8 時間	d1	21 日	非ホジキンリンパ腫
	オンコビン	ピンクリスチン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	全開	d1		
	テラルビシン	ピラルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1		
	エンドキサン	シクロホスファミド	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1		
	プレドニン	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分 または 内服	d1-5		
R-DeVIC	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 4-8 時間	d1	21 日	非ホジキンリンパ腫
	カルボプラチン	パラプラチン	300 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d2		
	イホマイド	イホスファミド	1500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d2-4		
	ベプシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d2-4		
	デキサート	デキサメタゾン	33 mg/body	点滴静注 30 分	d2-4		
CHASER	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 4~8hr	d1	21 日	非ホジキンリンパ腫
	エンドキサン	シクロホスファミド	1200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d2		
	エトポシド	エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d2-4		
	キロサイド	シタラビン	2000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d3,4		
	デキサート	デキサメタゾン	33mg/body	点滴静注 1 時間	d2-4		
R-ESHAP	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 4~8hr	d1	21 日	非ホジキンリンパ腫
	シスプラチン	シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d2-5		
	エトポシド	エトポシド	40mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d2-5		
	シタラビン	シタラビン	2000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d6		
	ソル・メドロール	メチルプレドニゾロン	500mg/body	点滴静注 15 分	d2-6		
VR-CAP	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,4,8,11	21 日	マンツル細胞リンパ腫
	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 4~8 時間	d1		
	アドリアシン	ドキシソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1		
	エンドキサン	シクロホスファミド	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1		
	プレドニン	プレドニゾロン	100 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-5		
CHASE	エンドキサン	シクロホスファミド	1200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1	21 日	非ホジキンリンパ腫
	エトポシド	エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1-3		

	キロサイド	シタラビン	2000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d2,3		
	デキサート	デキサメタゾン	33mg/body	点滴静注 1 時間	d1-3		
EPOCH	エトポシド	エトポシド	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1-4	21 日	非ホジキンリンパ腫
	オンコビン	ビンクリスチン	0.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1-4		
	アドリアシン	ドキシソルビシン	10 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1-4		
	エンドキサン	シクロホスファミド	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d5		
	プレドニン	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	1 日 2-3 回 内服	d1-5		
DA-EPOCH	エトポシド	エトポシド	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1-4	21 日 6 コース	非ホジキンリンパ腫
	オンコビン	ビンクリスチン	0.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1-4		
	アドリアシン	ドキシソルビシン	10 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1-4		
	エンドキサン	シクロホスファミド	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d5		
	プレドニン	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-5		
SMILE	メトトレキサート	メトトレキサート	2000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 6hr	d1	28 日	非ホジキンリンパ腫
	イホマイド	イホスファミド	1500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d2-4		
	デキサート	デキサメタゾン	33 mg/body	点滴静注 30 分	d2-4		
	エトポシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d2-4		
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	6000 U/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d8,10,12,14,16,18,20		
リツキサン単剤 weekly リツキサン(Rapid)	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 4-8hr	d1	7 日	非ホジキンリンパ腫
R-Benda	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 4-8hr	d1	28 日	低悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫・マントル細胞リンパ腫
	トレアキシシン	ベンダムスチン	90 mg/m <sup>2</sup>	10min	d1,2		
Bend 単剤	トレアキシシン	ベンダムスチン	90 mg/m <sup>2</sup>	10min	d1,2	21 日	低悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫・マントル細胞リンパ腫
R-GDP	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 4-8 時間	d1	21 日	非ホジキンリンパ腫
	デキサート	デキサメタゾン	33mg/body	点滴静注 15 分	d2-5		
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d2,9		
	ランダ	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d2		
R-ICE	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 4-8 時間	d1	21 日	非ホジキンリンパ腫
	パラプラチン	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 1 時間	d2		

	イホマイド	イホスファミド	5g/m <sup>2</sup>	点滴静 24 時間	d2		
	ベプシド	エトボシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d2-4		
アドセトリス療法	アドセトリス	ブレンツキシマブ ベドチン	1.8 mg/kg	点滴静注 30 分	d1	21 日	再発・難治性の CD30 陽性の 未分化大細胞リンパ腫 ホジキンリンパ腫
GDP	デキサート	デキサメタゾン	33mg/body	点滴静注 15 分	d1-4	21 日	非ホジキンリンパ腫
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8		
	ランダ	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		
GCD-R	リツキシマブ	リツキサン	375mg/m <sup>2</sup>	3-4 時間	d8	21 日	非ホジキンリンパ腫
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30 分	d1,8		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	60 分	d1		
	デキサメタゾン	デカドロン	40mg/body	15 分	d1-4		
R-GEM / DEX	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 4-8 時間	d1	28 日	非ホジキンリンパ腫
	デキサート	デキサメタゾン	33mg/body	点滴静注 30 分	d1,8,15		
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8,15		
GEM / DEX	デキサート	デキサメタゾン	33mg/body	点滴静注 30 分	d1,8,15	28 日	非ホジキンリンパ腫
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8,15		
R-hyperC-VAD cycle1,3,5,7	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2-6 時間	d1-3	21 日毎に hyperC- VAD と MA を交互に 実施 非ホジキンリンパ腫	バーキットリンパ腫
	エンドキサン	シクロホスファミド	300 mg/m <sup>2</sup> × 2	点滴静注 2hr	d4,11		
	オンコビン	ピンクリスチン	2 mg/body	全開	d4		
	アドリアシン	ドキシソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24hr	d1-4,d11-14		
	デキサート	デキサメタゾン	33 mg/body	点滴静注 30min	d2,8		
R-MA cycle2,4,6,8	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2-6hr	d1		
	メソトレキセート	メソトレキセート	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24hr	d2,3		
	キロサイド	シタラビン	2000 mg/m <sup>2</sup> × 2	点滴静注 3hr	28 日		
mLSG-15 (VCAP-AMP- VECP)	プレドニン	プレドニゾン	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8,15-17	28 日	非ホジキンリンパ腫
	オンコビン	ピンクリスチン	1 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1,15		
	アドリアシン	ドキシソルビシン	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8		
	エンドキサン	シクロホスファミド	350 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1		

	サイメリン	ラニムスチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d8		
	フィルデシン	ビンデシン	2.4 mg/m <sup>2</sup>	静注	d15		
	カルボプラチン	カルボプラチン	250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d15		
	エトポシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d15-17		
大量 Ara-C(PCNSL)	キロサイド	シタラビン	3000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d1,2	28 日 (2 コース)	中枢神経悪性リンパ腫 (再発難治性)
IVAC	キロサイド N	シタラビン	2g/m <sup>2</sup>	3 時間	d1,2	21 日	非ホジキンリンパ腫
	エンドキサン	イホスファミド	1.5g/m <sup>2</sup>	2 時間	d1-5		
	ベプシド	エトポシド	60 mg/m <sup>2</sup>	2 時間	d1-5		
	キロサイド N	シタラビン	2g/m <sup>2</sup>	3 時間	d1,2		
MTX+AraC	メトトレキセート	メトトレキセート	3.5g/m <sup>2</sup>	3 時間	d1	21 日	中枢神経悪性リンパ腫 (75 歳以下)
	シタラビン N	シタラビン	2g/m <sup>2</sup> X 2	3 時間	d2,3		
G-CHOP	ガザイバ	オビヌツズマブ	1000 mg	3~5 時間	d1,(d8,d15)	21 日 (6 コース後、GA のみ 2 か月毎に 2 年間)	濾胞性リンパ腫
	オンコビン	ピンクリスチン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	全開	d1		
	アドリアシン	ドキシルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	30 分	d1		
	エンドキサン	シクロホスファミド	750 mg/m <sup>2</sup>	30 分	d1		
	プレドニン	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	3~5 時間	d1-5		
G-B	ガザイバ	オビヌツズマブ	1000 mg	3~5 時間	d1,(d8,d15)	28 日 (6 コース後、GA のみ 2 か月毎に 2 年間)	濾胞性リンパ腫
	トレアキシシン	ベンダムスチン	90 mg/m <sup>2</sup>	10 分	d1,d2		
Romidepsin	イストダックス	ロミデプシン	14mg/m <sup>2</sup>	4 時間	d1,d8,d15	28 日間	末梢性 T 細胞性リンパ腫
Pralatrexate	ジフォルタ	プララトレキサート	30mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3~5 分	d1,8,15,22,29,36	末梢性 T 細胞性リンパ腫
A+CHP	アドセトリス	ブレンツキシマブ ベドチン	1.8 mg/kg	点滴静注 30 分	d1	21 日	CD30 陽性 末梢性 T 細胞リンパ腫
	アドリアシン	ドキシルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1		
	エンドキサン	シクロホスファミド	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1		
	プレドニン	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-5		
BDR	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下	d1,4,8,11	21 日	原発性マクログロブリン血症 リンパ形質細胞リンパ腫
	デカドロン	デキサメタゾン	40mg/body	内服	d1,4,8,11		
	リツキサン	リツキシマブ	375mg/m <sup>2</sup>	4~8hr	d11		
R-highCHOP	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	4~8 時間	d1,15	21 日	マンテル細胞リンパ腫
	デキサート	デキ	40mg/body	15 分	d1,15		
	オンコビン	オンコビン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	全開	d2		
	アドリアシン	ドキシルビシン	75 mg/m <sup>2</sup>	全開	d2		
	エンドキサン	シクロホスファミド	1500 mg/m <sup>2</sup>	1 時間	d2		
	プレドニン	プレドニゾロン	100mg/body		d2-6		
Pola+BR	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	1.5~8 時間	d1	21 日	DLBCL

	ポライビー	ポラツズマブベドチン	1.8mg/kg	90分※	d2		
	トリアキシン	ベンダムシチン	90mg/m <sup>2</sup>	60分	d2,3		
M-CHOP	メソトレキセート	メソトレキセート	3.5 g/m <sup>2</sup>	3時間	d1	21日	DLBCL(PCNSL)
	オンコビン	ビンクリスチン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	全開	d1		
	アドリアシン	ドキシソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	全開	d1		
	エンドキサン	シクロホスファミド	750 mg/m <sup>2</sup>	1時間	d1		
	プレドニン	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-5		

[血液内科へ戻る](#)

[Topへ戻る](#)

## 《ALL》

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
ALL-2020 寛解導入 (25-60歳未満)	エンドキサン	シクロホスファミド	1200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3hr	d1	-	Ph(-)急性リンパ性白血病
	ダウノマイシン	ダウノルビシン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d1-3		
	オンコビン	ビンクリスチン	1.3 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1,8,15,22		
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	3000 U/m <sup>2</sup>	点滴静注 2hr	d9,11,13,16,18,20		
	プレドニン	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-21		
ALL-2020 寛解導入 (60歳以上)	エンドキサン	シクロホスファミド	800 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3hr	d1	-	Ph(-)急性リンパ性白血病
	ダウノマイシン	ダウノルビシン	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d1-3		
	オンコビン	ビンクリスチン	1.3 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1,8,15,22		
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	3000 U/m <sup>2</sup>	点滴静注 2hr	d9,11,13,16,18,20		
	プレドニン	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-7		
ALL2020 地固め 1コース (25-59歳)	キロサイド	シタラビン	2000 mg/m <sup>2</sup> × 2	点滴静注 3hr	d1-3	-	Ph(-)急性リンパ性白血病
	エトポシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d1-3		
	デキサート	デキサメタゾン	33 mg/body	点滴静注 1hr	d1-3		
	メソトレキセート	メソトレキセート	15 mg/body	髄注	d1		
	デキサート	デキサメタゾン	3.3 mg/body	髄注	d1		
ALL2020 地固め 1コース	キロサイド	シタラビン	1000 mg/m <sup>2</sup> × 2	点滴静注 3hr	d1-3	-	



(60 歳以上)	エトポシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d1-3		Ph(-)急性リンパ性白血病
	デキサート	デキサメタゾン	33 mg/body	点滴静注 1hr	d1-3		
	メトレキセート	メトレキサート	15 mg/body	髄注	d1		
	デキサート	デキサメタゾン	3.3 mg/body	髄注	d1		
ALL2020 地固め 2 コース	メトレキセート	メトレキサート	3000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24hr	d1,15	-	Ph(-)急性リンパ性白血病
	オンコビン	ビンクリスチン	1.3 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1,15		
	ロイケリン	メルカプトプリン	25 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-21		
ALL2020 地固め 3 コース	アドリアシン	ドキシソルビシン	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d1,8,15	-	Ph(-)急性リンパ性白血病
	オンコビン	ビンクリスチン	1.3 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1,8,15		
	デキサート	デキサメタゾン	10 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-8,15-22		
	エンドキサン	シクロホスファミド	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3hr	d29		
	キロサイド	シタラビン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d29-33,36-40		
	ロイケリン	メルカプトプリン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	d29-42		
ALL-202U 寛解導入 (15-25 歳未満)	プレドニン	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-7	35 日	Ph(-)急性リンパ性白血病 (15-25 歳未満)
	プレドニン	プレドニゾロン	40 mg/m <sup>2</sup>	内服	d15-28		
	メトレキセート	メトレキサート	12 mg/body	髄注	d1		
	デキサート	デキサメタゾン	10 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d8-14		
	エンドキサン	シクロホスファミド	1200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d10		
	テラルビシン	ピラルビシン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d8,9		
	オンコビン	ビンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>	静注 10 分	d8,15,22,29		
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	6000 U/m <sup>2</sup>	点滴静注 4hr	d15,17,19,21,23,25,27,29		
	メトレキセート	メトレキサート	12 mg/body	髄注	d8,(11,15),22		
	ハイドロコトソン	ヒドロコルチゾン	25 mg/body	髄注	d8,(11,15),22		
	キロサイド	シタラビン	30 mg/body	髄注	d8,(11,15),22		
ALL-202U 地固め 1 コース (15-25 歳未満)	エンドキサン	シクロホスファミド	750 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d1,8	28 日	Ph(-)急性リンパ性白血病 (15-25 歳未満)
	テラルビシン	ピラルビシン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d1,2		
	キロサイド	シタラビン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d1-6,8-13		
	ロイケリン	メルカプトプリン	50 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-14		
	メトレキセート	メトレキサート	12 mg/body	髄注	d1,8		

	ハイドロコト	ヒドロコルチゾン	25 mg/body	髄注	d1,8		
	キロサイド	シタラビン	30 mg/body	髄注	d1,8		
ALL-202U 地固め 2 コース (Sanctuary Therapy) (15-25 歳未満)	メトレキセート	メトレキサート	3000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24hr	d1,8	28 日	Ph(-)急性リンパ性白血病 (15-25 歳未満)
	メトレキセート	メトレキサート	12 mg/body	髄注	d2,9		
	ハイドロコト	ヒドロコルチゾン	25 mg/body	髄注	d2,9		
	キロサイド	シタラビン	30 mg/body	髄注	d2,9		
ALL-202U 地固め 3 コース (Reinduction Therapy) (15-25 歳未満)	オンコビン	ピンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>	静注 10 分	d1,8,15	21 日	Ph(-)急性リンパ性白血病 (15-25 歳未満)
	テラルビシン	ピラルビシン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d1,8		
	エンドキサン	シクロホスファミド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d1,8		
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	6000 U/m <sup>2</sup>	筋注	d1,3,5,8,10,12		
	プレドニン	プレドニゾン	40 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-14		
	メトレキセート	メトレキサート	12 mg/body	髄注	d1		
	ハイドロコト	ヒドロコルチゾン	25 mg/body	髄注	d1		
	キロサイド	シタラビン	30 mg/body	髄注	d1		
ALL-202U 維持 1 コース (初診時中枢神経病変陰性) (Maintenance Therapy①③) (15-25 歳未満)	メトレキセート	メトレキサート	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 10 分	d1,15,29	28 日	Ph(-)急性リンパ性白血病 (15-25 歳未満) (初診時中枢神経病変陰性)
	ロイケリン	メルカプトプリン	50 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-28		
	メトレキセート	メトレキサート	12 mg/body	髄注	d29		
	ハイドロコト	ヒドロコルチゾン	25 mg/body	髄注	d29		
	キロサイド	シタラビン	30 mg/body	髄注	d29		
ALL-202U 維持 1 コース (初診時中枢神経病変陽性) (Maintenance Therapy①③) (15-25 歳未満)	メトレキセート	メトレキサート	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 10 分	d29	42 日	Ph(-)急性リンパ性白血病 (15-25 歳未満) (初診時中枢神経病変陽性)
	ロイケリン	メルカプトプリン	50 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-28		
	メトレキセート	メトレキサート	12 mg/body	髄注	d1,8		
	ハイドロコト	ヒドロコルチゾン	25 mg/body	髄注	d1,8		
	キロサイド	シタラビン	30 mg/body	髄注	d1,8		
ALL-202U 維持 2 コース (Maintenance Therapy②) (15-25 歳未満)	オンコビン	ピンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>	静注 10 分	d1,8,15	21 日	Ph(-)急性リンパ性白血病 (15-25 歳未満)
	エンドキサン	シクロホスファミド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d8		
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	10000 U/m <sup>2</sup>	筋注	d1,8,15		
	プレドニン	プレドニゾン	40 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-14		

ALL-202U 維持 4 コース (Maintenance Therapy④) (15-25 歳未満)	オンコビン	ビンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>	静注 10 分	d1,8,15	21 日	Ph(-)急性リンパ性白血病 (15-25 歳未満)
	テラルビシン	ピラルビシン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d8		
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	10000 U/m <sup>2</sup>	筋注	d1,8,15		
	プレドニン	プレドニゾロン	40 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-14		
Ph+ ALL208 寛解導入療法 (15-59 歳)	エンドキサン	シクロホスファミド	1200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3hr	d1	42 日	Ph(+急性リンパ性白血病
	ダウノマイシン	ダウノルビシン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d1-3		
	オンコビン	ビンクリスチン	1.3 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1,8,15,22		
	プレドニン	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-21		
	グリベック	イマチニブ	600 mg/body	内服	d8-42		
Ph+ ALL208 寛解導入療法 (60 歳以上)	エンドキサン	シクロホスファミド	800 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3hr	d1	42 日	Ph(+急性リンパ性白血病
	ダウノマイシン	ダウノルビシン	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d1-3		
	オンコビン	ビンクリスチン	1.3 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1,8,15,22		
	プレドニン	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-7		
	グリベック	イマチニブ	600 mg/body	内服	d8-42		
Ph+ ALL208 C1 (15-59 歳)	メトトレキサート	メトトレキサート	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24hr	d1	28 日	Ph(+急性リンパ性白血病
	キロサイド	シタラビン	2000 mg/m <sup>2</sup> × 2	3hr	d2-3		
Ph+ ALL208 C1 (60 歳以上)	メトトレキサート	メトトレキサート	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24hr	d1	28 日	Ph(+急性リンパ性白血病
	キロサイド	シタラビン	1000 mg/m <sup>2</sup> × 2	3hr	d2-3		
Ph+ ALL208 C2	オンコビン	ビンクリスチン	1.3 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1	21 日	Ph(+急性リンパ性白血病
	ダウノマイシン	ダウノルビシン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d1		
	エンドキサン	シクロホスファミド	1200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3hr	d1		
	プレドニン	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-7		
	グリベック	イマチニブ	600 mg/body	内服	d2-21		
Ph+ ALL208 維持療法	オンコビン	ビンクリスチン	1.3 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1	28 日	Ph(+急性リンパ性白血病
Ph+ ALL213 寛解導入療法	プレドニン	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-21	42 日	Ph(+急性リンパ性白血病
	スプリセル	ダサチニブ	140 mg/body/日	内服	d8-35		
	メトトレキサート	メトトレキサート	15 mg/body	髄注	d22		
	デキサート	デキサメタゾン	3.3 mg/body	髄注	d22		

Ph+ALL213 強化地固め療法	エンドキサン	シクロホスファミド	1200 mg/m <sup>2</sup> (15-59 歳) 900 mg/m <sup>2</sup> (60-65 歳)	点滴静注 3hr	d1	42 日	Ph(+) <u>急性リンパ性白血病</u>
	ダウノマイシン	ダウノルビシン	45 mg/m <sup>2</sup> (15-59 歳) 30 mg/m <sup>2</sup> (60-65 歳)	点滴静注 1hr	d1, 2, 3		
	オンコビン	ビンクリスチン	1.3 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1, 8, 15, 22		
	スプリセル	ダサチニブ	100 mg/body/日	内服	d4-31		
	プレドニン	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup> (15-59 歳) 45 mg/m <sup>2</sup> (60-65 歳)	内服	d1-21		
	メトトレキサート	メトトレキサート	15 mg/body	髄注	d1		
	デキサート	デキサメタゾン	3.3 mg/body	髄注	d1		
Ph+ALL213 C1 療法	メトトレキサート	メトトレキサート	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24hr	d1	28 日 4 コース	Ph(+) <u>急性リンパ性白血病</u>
	キロサイド	シタラビン	2000 mg/m <sup>2</sup> × 2 (15-59 歳) 1000 mg/m <sup>2</sup> × 2 (60-65 歳)	点滴静注 3hr	d2-3		
	ソルメドロール	メチルプレドニゾロン	50mg/body × 2	点滴静注 30 分	d1,2,3		
	スプリセル	ダサチニブ	100 mg/body/日	内服	d4-24		
	メトトレキサート	メトトレキサート	15 mg/body	髄注	d1		
	デキサート	デキサメタゾン	3.3 mg/body	髄注	d1		
Ph+ALL213 C2 療法 (15-64 歳)	エンドキサン	シクロホスファミド	1200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3hr	d1	28 日 4 コース	Ph(+) <u>急性リンパ性白血病</u>
	ダウノマイシン	ダウノルビシン	45 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d1		
	オンコビン	ビンクリスチン	1.3 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1		
	プレドニン	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-14		
	スプリセル	ダサチニブ	100 mg/body/日	内服	d2-22		
	メトトレキサート	メトトレキサート	15 mg/body	髄注	d1		
	デキサート	デキサメタゾン	3.3 mg/body	髄注	d1		
Ph+ALL213 維持療法	オンコビン	ビンクリスチン	1.3 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1	35 日	Ph(+) <u>急性リンパ性白血病</u>
	プレドニン	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-7		
	スプリセル	ダサチニブ	100 mg/body/日	内服 1 日 1 回	d1-28		
T-ALL213-O 寛解導入療法	エンドキサン	シクロホスファミド	1200 mg/m <sup>2</sup> (60-65 歳: 800 mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注 3hr	d8	29 日	T 細胞性急性リンパ性 白血病
	ダウノマイシン	ダウノルビシン	45 mg/m <sup>2</sup> (60-65 歳: 30mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注 1hr	d8-10		

	オンコビン	ビンクリスチン	1.3 mg/m <sup>2</sup> (max 2mg)	静注	d1,8,15,22,29		
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	5000 KU/m <sup>2</sup> (60-65 歳: 3000 KU/m <sup>2</sup> )	点滴静注 2hr	d15,17,19,21,23,25,27,29		
	プレドニン	プレドニゾロン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	45 歳未満: d8-28 45-59 歳: d8-21 60 歳以上: d8-14		
	IT-Triple			髄注	d8,d15		
T-ALL213-O IT-Triple	メトトレキサート	メトトレキサート	15 mg/body	髄注			
	キロサイド	シタラビン	40 mg/body	髄注			
	デキサート	デキサメタゾン	3.3 mg/body	髄注			
T-ALL213-O 再寛解導入療法	アラノンジ	ネララビン	1500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2hr	d1,3,5	42 日	T 細胞性急性リンパ性 白血病
	エンドキサン	シクロホスファミド	1000 mg/m <sup>2</sup> (60-65 歳: 800 mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注 3hr	d8		
	ロイケリン	メルカプトプリン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	d8-21		
	キロサイド	シタラビン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d8-12,15-19		
	IT-Triple			髄注	d8		
T-ALL213-O 地固め 1,4 コース	キロサイド	シタラビン	2000 mg/m <sup>2</sup> × 2 (60 歳以上: 1000 mg/m <sup>2</sup> × 2)	点滴静注 3hr	d1-3	28 日	T 細胞性急性リンパ性 白血病
	ベプシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d1-3		
	デキサート	デキサメタゾン	33 mg/body	点滴静注 1hr	d1-3		
	IT-Triple			髄注	d1		
T-ALL213-O 地固め 2 コース	メトトレキサート	メトトレキサート	3000 mg/m <sup>2</sup> (50 歳以上: 1500 mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注 24hr	d1,15	28 日	T 細胞性急性リンパ性 白血病
	オンコビン	ビンクリスチン	1.3 mg/m <sup>2</sup> (max 2mg)	静注	d1,15		
	ロイケリン	メルカプトプリン	25 mg/m <sup>2</sup>	内服 眠前	d1-21		
	IT-Triple			髄注	d1,15		
T-ALL213-O 地固め 3 コース	オンコビン	ビンクリスチン	1.3 mg/m <sup>2</sup> (max 2mg)	静注	d1,8,15	49 日	T 細胞性急性リンパ性 白血病
	アドリアシン	ドキソルビシン	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d1,8,15		
	デキサート	デキサメタゾン	10 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-8,15-22		

	アラノンジ	ネララビン	1500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2hr	d29,31,33		
	エンドキサン	シクロホスファミド	1200 mg/m <sup>2</sup> (60-65 歳: 800 mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注 3hr	d36		
	ロイケリン	メルカプトプリン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服 眠前	d36-49		
	キロサイド	シタラビン	75 mg/m <sup>2</sup> × 2 (60 歳以上: mg/m <sup>2</sup> × 2)	点滴静注 3hr	d36-40,43-47		
	IT-Triple			髄注	d1,36		
T-ALL213-O 地固め 5 コース	メソトレキセート	メソトレキセート	3000 mg/m <sup>2</sup> (50 歳以上: 1500 mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注 24hr	d1,15	33 日	T 細胞性急性リンパ性 白血病
	オンコビン	ビンクリスチン	1.3 mg/m <sup>2</sup> (max 2mg)	静注	d1,15		
	ロイケリン	メルカプトプリン	25 mg/m <sup>2</sup>	内服 眠前	d1-21		
	アラノンジ	ネララビン	1500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2hr	d29,31,33		
	IT-Triple			髄注	d1,15		
ネララビン	アラノンジ	ネララビン	1500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2.5hr	d1, 3, 5	21 日	T 細胞性急性リンパ性 白血病 (再発・難治) T 細胞リンパ芽球性リンパ腫
CFB+CY+ETP	エボルトラ	クロファラビン	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2hr	d1-5	-	再発・難治上に、若年者 ALL 再寛解導入 (21 歳以下)
	エンドキサン	シクロホスファミド	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d1-5		
	ベブシド	エトポシド	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2hr	d1-5		
AdVP	オンコビン	ビンクリスチン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	全開	d1,8,15,22		ALL(通常の強度の抗がん剤が投与できない患者)
	アドリアシン	ドキシソルビシン	20mg/m <sup>2</sup>	30 分	d1,2,3,15,16,17		
	プレドニン	プレドニン	40mg/m <sup>2</sup> /body		d1-28		
Blinatumomab	ビーリンサイト	ブリナツモマブ					B-ALL
Ino	ベスポンサ	イノツズマブオゾガマイシン			d1,8,15	28 日	ALL

[血液内科へ戻る](#)

[Top へ戻る](#)

## 《AML》

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
IDA+Ara-C(3-7set) (AML201 寛解導入)	イダマイシン	イダルビシン	12 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1-3	28日	急性骨髄性白血病 寛解導入療法
	キロサイド	シタラビン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24時間	d1-7		
DNR+Ara-C(5-7set) (AML201 寛解導入)	ダウノマイシン	ダウノルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1-5	28日	急性骨髄性白血病 寛解導入療法
	キロサイド	シタラビン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24時間	d1-7		
HD-Ara-C (AML201 地固め)	キロサイド	シタラビン	2000 mg/m <sup>2</sup> × 2	点滴静注 3時間	d1-5	28日	急性骨髄性白血病 寛解後療法
MIT+Ara-C (AML201 地固め 1コース)	ノバントロン	ミトキサントロン	7 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1-3	28日	急性骨髄性白血病 地固め療法
	キロサイド	シタラビン	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24時間	d1-5		
DNR+Ara-C (AML201 地固め 2コース)	ダウノマイシン	ダウノルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1-3	28日	急性骨髄性白血病 地固め療法
	キロサイド	シタラビン	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24時間	d1-5		
ACR+Ara-C (AML201 地固め 3コース)	ア克蘭ソノ	アクラルビシン	20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1-5	28日	急性骨髄性白血病 地固め療法
	キロサイド	シタラビン	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24時間	d1-5		
A triple V (AML201 地固め 4コース)	キロサイド	シタラビン	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24時間	d1-5	28日	急性骨髄性白血病 地固め療法
	エトポシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3時間	d1-5		
	オンコピン	ビンクリスチン	0.8 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	d8		
	フィルデシン	ビンデシン	2 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	d10		
CAG(Ara-C 持続)	ア克蘭ソノ	アクラルビシン	14 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1-4	28日	急性骨髄性白血病 寛解導入療法
	キロサイド	シタラビン	20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24時間	d1-14		
	G-CSF			皮下注	d1-14		
CAG(Ara-C 皮下注)	ア克蘭ソノ	アクラルビシン	14 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1-4	28日	急性骨髄性白血病 寛解導入療法
	キロサイド	シタラビン	10 mg/m <sup>2</sup> × 2	皮下注	d1-14		
	G-CSF			皮下注	d1-14		
MEC (低用量 Ara-C)	ノバントロン	ミトキサントロン	8 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1-3	28日	急性骨髄性白血病 地固め療法
	エトポシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3時間	d1-5		
	シタラビン	シタラビン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24時間	d1-7		
MEC (中等量 Ara-C)	ノバントロン	ミトキサントロン	8 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1-5	28日	再発難治急性骨髄性白血病

	エトポシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1-5		
	シタラビン	シタラビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d1-5		
GO	マイロターグ	ゲムツズマブ オゾガマイシン	9 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1	14 日	再発難治 CD33 陽性急性骨髄性白血病
FLAG-IDA	ノイトロジン	フィルグラスチム	300 µg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1-6	28 日	難治性急性骨髄性白血病
	フルダラ	フルダラビン	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d2-6		
	シタラビン	シタラビン	2000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d2-6		
	イダマイシン	イダルビシン	10 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d2-4		
FLAG-IDA-GO	ノイトロジン	フィルグラスチム	300 µg/m <sup>2</sup>	60 分	d1-3	28 日	難治性急性骨髄性白血病
	マイロターグ	ゲムツズマブ オゾガマイシン	3mg/m <sup>2</sup>	2 時間	d1		
	フルダラ	フルダラビン	30mg/m <sup>2</sup>	30 分	d2-5		
	シタラビン N	シタラビン	2000mg/m <sup>2</sup>	3 時間	d2-5		
	イダマイシン	イダルビシン	10mg/m <sup>2</sup>	60 分	d2-4		
FLAGM	フィルグラスチム	フィルグラスチム	300 µg/m <sup>2</sup>	皮下注	d1-4	28 日	難治性急性骨髄性白血病
	フルダラ	フルダラビン	15mg/m <sup>2</sup> × 2	30 分	d2-5		
	シタラビン	シタラビン	2g/m <sup>2</sup> × 2	3 時間	d2-5		
	ノバントロン	ミトキサントロン	10mg/m <sup>2</sup>	30 分	d4-6		
S-HAM	シタラビン	シタラビン	3g/m <sup>2</sup> × 2	3 時間	d1-2,8-9	35 日	難治性急性骨髄性白血病
	ノバントロン	ノバントロン	10mg/m <sup>2</sup>	30 分	d3-4,10-11		
Ven+Aza		アザシチジン	75mg/m <sup>2</sup>	皮下注	d1-7	28 日	AML
		ベネトクラクス	400mg/body	内服	d1-28		
Ven+LDAC		シタラビン	20mg/m <sup>2</sup>	皮下注	d1-10	28 日	AML
		ベネトクラクス	600mg/body	内服	d1-28		

[血液内科へ戻る](#)

[Top へ戻る](#)

## 《APL》

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
	イダマイシン	イダルビシン	12 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1-3		急性前骨髄性白血病 非高齢者(16-64 歳)



APL212 寛解導入療法(A→D 群)	キロサイド	シタラビン	100 mg/m <sup>2</sup>	持続静注 24 時間	d1-7		寛解導入療法
	ベサノイド	トレチノイン	45 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-		
APL212 寛解導入療法 (B 群)	イダマイシン	イダルビシン	12 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,2		急性前骨髄性白血病 非高齢者(16-64 歳) 寛解導入療法
	キロサイド	シタラビン	100 mg/m <sup>2</sup>	持続静注 24 時間	d1-5		
	ベサノイド	トレチノイン	45 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-		
APL212 寛解導入療法(B→D 群)	イダマイシン	イダルビシン	12 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1		急性前骨髄性白血病 非高齢者(16-64 歳) 寛解導入療法
	キロサイド	シタラビン	100 mg/m <sup>2</sup>	持続静注 24 時間	d1,2		
	ベサノイド	トレチノイン	45 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-		
APL212 寛解導入療法(C 群)	イダマイシン	イダルビシン	12 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1-3		急性前骨髄性白血病 非高齢者(16-64 歳) 寛解導入療法
	キロサイド	シタラビン	100 mg/m <sup>2</sup>	持続静注 24 時間	d1-7		
	ベサノイド	トレチノイン	45 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-		
APL212 寛解導入療法(C→D 群)	イダマイシン	イダルビシン	12 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1		急性前骨髄性白血病 非高齢者(16-64 歳) 寛解導入療法
	ベサノイド	トレチノイン	45 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-		
ATO (APL212 地固め 第 1.3 コース)	トリセノックス	三酸化ヒ素	0.15 mg/kg	点滴静注 2 時間	1 週間に 5 日間	35 日	急性前骨髄性白血病 非高齢者(16-64 歳) 地固め療法
	メトトレキセート	メトトレキサート	15mg/body	髄注	C2 終了後		
	キロサイド	シタラビン	40 mg/body	髄注	C2 終了後		
	プレドニン	プレドニゾン	10 mg/body	髄注	C2 終了後		
DNR+Ara-C(3-5set) (APL212 地固め第 2 コース)	ダウノマイシン	ダウノルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1-3	28 日	急性前骨髄性白血病 非高齢者(16-64 歳) 地固め療法
	キロサイド	シタラビン	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1-5		
GO (APL212 地固め第 4 コース)	マイロターグ	ゲムツズマブ オゾガマイシン	4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1,15	28 日	急性前骨髄性白血病 非高齢者(16-64 歳) 地固め療法
APL212G 寛解導入療法 (A→D 群)	イダマイシン	イダルビシン	12 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1-3		急性前骨髄性白血病 高齢者(65 歳以上) 寛解導入療法
	ベサノイド	トレチノイン	45 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-		

APL212G 寛解導入療法 (B 群)	イダマイシン	イダルビシン	12 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,2		急性前骨髄性白血病 高齢者(65歳以上) 寛解導入療法
	ベサノイド	トレチノイン	45 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-		
APL212G 寛解導入療法 (C 群)	イダマイシン	イダルビシン	8 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1-3		急性前骨髄性白血病 高齢者(65歳以上) 寛解導入療法
	ベサノイド	トレチノイン	45 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-		
APL212G 寛解導入療法 (B,C→D 群)	イダマイシン	イダルビシン	12 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1		急性前骨髄性白血病 高齢者(65歳以上) 寛解導入療法
	ベサノイド	トレチノイン	45 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-		
ATO (APL212G 地固め 第 1,2 コース)	トリセノックス	三酸化ヒ素	0.15 mg/kg	点滴静注 2 時間	1 週間に 5 日間	35 日	急性前骨髄性白血病 高齢者(65歳以上) 地固め療法
	メトトレキサート	メトトレキサート	15mg/body	髄注	C2 終了後		
	キロサイド	シタラビン	40 mg/body	髄注	C2 終了後		
	プレドニン	プレドニゾン	10 mg/body	髄注	C2 終了後		
APL205R 寛解導入	トリセノックス	三酸化ヒ素	0.15 mg/kg	点滴静注 2 時間	d1-	寛解が得られる まで最大 60 回	急性前骨髄性白血病 寛解導入療法
	イダマイシン	イダルビシン	12 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	(d1,2)	(WBC> 20000/μL or APL 細胞> 5000/μL or プラストーマの ある場合)	

[血液内科へ戻る](#)

[Top へ戻る](#)

## 《自家移植》

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
LEED	アルケラン	メルファラン	130 mg/m <sup>2</sup>	3 時間	d4	—	自家造血幹細胞移植前処置 悪性リンパ腫
	エンドキサソ	シクロホスファミド	60 mg/kg	2 時間	d1,2		
	エトポシド	エトポシド	500 mg/m <sup>2</sup>	8 時間	d1,2,3		
	デキサート	デキサメタゾン	40 mg/body	1 時間	d1,2,3,4		

MEAM	サイメリン	ラニムスチン	300mg/m <sup>2</sup>	30 分	d1	—	自家造血幹細胞移植前処置 悪性リンパ腫
	ベプシド	エトポシド	200mg/m <sup>2</sup>	3 時間	d2,3,4,5		
	キロサイド	シタラビン	200mg/m <sup>2</sup> × 2	1 時間	d2,3,4,5		
	アルケラン	メルファラン	140mg/m <sup>2</sup>	30 分	d6		
BU+MEL	アルケラン	メルファラン	140mg/m <sup>2</sup>	30 分	d1	—	自家造血幹細胞移植前処置 AML
	ブスルフェクス	ブスルファン	0.8 mg/kg × 4	2hr	d2,3,4,5		
アルケラン大量	アルケラン	メルファラン	100mg/m <sup>2</sup>	30 分	d1,2	—	自家造血幹細胞移植前処置 多発性骨髄腫
エンドキサン大量	エンドキサン	シクロホスファミド	2000mg/m <sup>2</sup>	2 時間	d1,2	—	末梢血幹細胞採取前処置
BuTT	リサイオ	チオテパ	200 mg/m <sup>2</sup>	2 時間	d5,6	—	自家造血幹細胞移植前処置
	ブスルフェクス	ブスルファン	3.2mg/kg	3 時間	d1-4		
TT+L-PAM	アルケラン	メルファラン	70mg/m <sup>2</sup>	30 分	day1.2.8.9	—	自家造血幹細胞移植前処置
	リサイオ	チオテパ	200 mg/m <sup>2</sup>	24 時間	day1.2.8.9		

[Top へ戻る](#)

## 《同種移植》

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
BU+CY( BU+CY once daily)	エンドキサン	シクロホスファミド	60 mg/kg	2hr	d1,2,3,4,	—	同種造血細胞移植前処置
	ブスルフェクス	ブスルファン	0.8 mg/kg × 4	2hr	d5,6		
Flu+BU4 Flu+BU4 once daily	フルダラ	フルダラビン	30 mg/m <sup>2</sup>	30min	d1-6	—	同種造血細胞移植前処置
	ブスルフェックス	ブスルファン	0.8 mg/kg × 4	2hr	d5,6		
	±TBI		2-4Gy				
Flu+Mel 180	フルダラ	フルダラビン	25 mg/m <sup>2</sup>	30min	d1,2,3,4,5	—	同種造血細胞移植前処置
	アルケラン	メルファラン	90 mg/m <sup>2</sup>	30min	d4,5		
ETP-CY-TBI(前処置)	ベプシド	エトポシド	15 mg/kg	6hr	d1,2	—	急性骨髄性白血病 移植前処置
	エンドキサン	シクロホスファミド	60 mg/kg	2hr	d3, 4		
	TBI				d-3,-2		

CY-TBI(前処置)	エンドキサン	シクロホスファミド	60 mg/kg	2hr	d-1,2	—	同種造血細胞移植前処置
	TBI						
G-combined Ara-C+CY	キロサイド	シタラビン	3 g/m <sup>2</sup> × 2	3hr	d4,5	—	同種造血細胞移植前処置 (非寛解の急性骨髄性白血病,MDS)
	エンドキサン	シクロホスファミド	60 mg/kg	2hr	d6,7		
Flu+CY+ATG	フルダラ	フルダラビン	30 mg/m <sup>2</sup>	30min	d1,2,3,4	—	同種造血幹細胞移植前処置 (主に再生不良性貧血)
	サイモグロブリン	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	3.75 mg/kg	点滴静注 6時間以上	d1,2,3,4		
	エンドキサン	シクロホスファミド	300 mg/m <sup>2</sup>	1hr	d1,2,3,4		
Flu+Mel4+BU Flu+Mel+BU once daily	フルダラ	フルダラビン	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d-7,-6,-5,-4,-3,-2	7日	同種造血幹細胞移植前処置
	ブスルフェクス	ブスルファン	0.8 mg/kg × 4	点滴静注 2hr	d-7,-6,-5,-4		
	アルケラン	メルファラン	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3分	d-3,-2		
1 day Flu+CY+ATG	フルダラ	フルダラビン	30 mg/m <sup>2</sup>	30min	d1,2,3	—	移植後生着不全に対する 再移植前処置
	エンドキサン	シクロホスファミド	2 g/m <sup>2</sup>	3hr	d3		
	サイモグロブリン	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	2.5 mg/kg	点滴静注 6時間以上	d3		
(限)Haplo mini	フルダラ	フルダラビン	30 mg/m <sup>2</sup>	30分	d1,2,3,4,5,6	—	同種造血細胞移植前処置 血縁者間 HLA2-3 抗原不適合 ミニ移植前処置
	ブスルフェックス	ブスルファン	0.8mg/kg × 4	2時間	d5,6		
	サイモグロブリン	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	1.25 mg/kg	点滴静注 6時間	d9,10		
	シタラビン	シタラビン(腫瘍量が多い時のみ)	2g/m <sup>2</sup>	3時間	d1,2,3,4,5,6		
(限)兵医 Haplo フル	フルダラ	フルダラビン	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,2,3,4	—	同種造血細胞移植前処置 血縁者間 HLA 半合致 フル移植前処置
	シタラビン	シタラビン	2 g/m <sup>2</sup>	点滴静注 6時間	d1,2,3,4		
	エンドキサン	シクロホスファミド	60 mg/kg	点滴静注 3時間	d7,8		
	サイモグロブリン	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	1 mg/kg	点滴静注 6時間	d9,10		
	TBI		2 Gy		d7,8,9,10		
G-combined Flu+BU+AraC	フルダラ	フルダラビン	30 mg/m <sup>2</sup>	30分	d1,2,3,4,5,6	—	同種造血細胞移植前処置
	ブスルフェックス	ブスルフェックス	3.2mg/kg	3時間	d1,2,3		
	キロサイド	シタラビン	6g/m <sup>2</sup>	3時間			
Flu+CY+ATG(KSGCT)		フルダラビン	30mg/m <sup>2</sup>	30分	d-6,-5,-4,-3		同種造血幹細胞移植前処置 (主に再生不良性貧血)
		シクロホスファミド	25mg/kg	2時間	d-6,-5,-4,-3		
		抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	1.25mg/kg	6時間※	d-4,-3		

## 《移植後 GVHD 予防》

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
PTCY	エンドキサン	シクロホスファミド	60 mg/kg	2 時間	D3,4	2 日	造血幹細胞移植後
short MTX (10-7-7)	メトトレキサート	メトトレキサート	10 mg/m <sup>2</sup> (d1) 7 mg/m <sup>2</sup> (d3) 7 mg/m <sup>2</sup> (d6)	10 分	d1,3,6	—	造血幹細胞移植後
short MTX (15-10-10-10)	メトトレキサート	メトトレキサート	15 mg/m <sup>2</sup> (d1) 10 mg/m <sup>2</sup> (d3) 10 mg/m <sup>2</sup> (d6) 10 mg/m <sup>2</sup> (d11)	10 分	d1,3,6,11	—	造血幹細胞移植後

[血液内科へ戻る](#)

[Top へ戻る](#)

## 《骨髄腫》

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
MPB	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分 または 皮下注	1-4 サイクル: d1,4,8,11,22,25,29,32 5 サイクル以降: d1,8,22,29	42 日	多発性骨髄腫 初回治療
	プレドニン	プレドニゾン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-4		
	アルケラン	メルファラン	9 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-4		
VTD	レナデックス	デキサメタゾン	40 mg/body	内服	d1,4,8,11	21 日	多発性骨髄腫
	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注	d1,4,8,11		
	サレド	サリドマイド	200 mg/body	内服	連日		
VRD	レナデックス	デキサメタゾン	40 mg/body	内服	d1,4,8,11	21 日	多発性骨髄腫
	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注	d1,4,8,11		
	レブラミド	レナリドマイド	25 mg/body	内服	連日		
Kd	カイクロリス	カルフィゾミブ	56mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,2,8,9,15,16	28 日	多発性骨髄腫
	デカドロン	デキサメタゾン	20 mg/body	内服	d1,2,8,9,15,16,22,23		

wKd	カイプロリス	カルフィゾミブ	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8,15	28 日	多発性骨髄腫
	デカドロン	デキサメタゾン	40 mg/body	内服	d1,8,15,22		
KRd	カイプロリス	カルフィゾミブ	27mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 10 分	d1,2,8,9,15,16	28 日	多発性骨髄腫
	デカドロン	デキサメタゾン	40 mg/body	内服	d1,8,15,22		
	レブラミド	レナリドマイド	25 mg/body	内服	d1-21		
ERd	エムプリシティ	エロツズマブ	10mg/kg	点滴静注	d1,8,15,22(1-2 コース) d1,15(3 コース以降)	28 日	多発性骨髄腫 (再発難治)
	デカドロン	デキサメタゾン	40 mg/body	内服 or 注射	d1,8,15,22(1-2 コース) d8,22(3 コース以降)		
	レブラミド	レナリドマイド	25 mg/body	内服	d1-21		
Bor/Dex	デキサート	デキサメタゾン	16.5 mg/body	点滴静注 15 分 または 内服	d1,4,8,11	21 日	多発性骨髄腫
	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分 または 皮下注	d1,4,8,11		
Bor/Dex weekly (4 投 1 休)	デキサート	デキサメタゾン	16.5 mg/body	点滴静注 15 分 または 内服	d1,8,15,22	35 日	多発性骨髄腫
	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分 または 皮下注	d1,8,15,22		
CyBorD weekly	デキサート	デキサメタゾン	40 mg/body	点滴静注 15 分 または 内服	d1,8,15,22	28 日	多発性骨髄腫
	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分 または 皮下注	d1,8,15,22		
	エンドキサン	シクロホスファミド	300 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分 または 内服	d1,8,15,22		
iPAD	デキサート	デキサメタゾン	20 mg/body	内服	d1,2,4,5,8,9,11,12	21 日 6 コース	多発性骨髄腫 再発難治
	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.0 mg/m <sup>2</sup>	皮下注	d1,4,8,11		
	アドリアシン	ドキシソルビシン	9 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1-4		
VAD	オンコビン	ビンクリスチン	0.4 mg/body	24hr	d1-4	28 日	多発性骨髄腫
	アドリアシン	ドキシソルビシン	9 mg/m <sup>2</sup>	24hr	d1-4		

	デキサート	デキサメタゾン	20 mg/body	p.o.	d1-4,d9-12,d17-20		
C-VAD	エンドキサン	シクロホスファミド	500 mg/m <sup>2</sup>	1hr	d1,8	21 日	多発性骨髄腫
	オンコビン	ビンクリスチン	0.5 mg/body	24hr	d1-4		
	アドリアシン	ドキシソルビシン	10 mg/m <sup>2</sup>	24hr	d1-4		
	デキサート	デキサメタゾン	40 mg/body	p.o.	d1-4,d9-12		
DRD	ダラキューロ	ダラツムマブ	1800mg	皮下注	d1,8,15,22	28 日	多発性骨髄腫
	デカドロン	デキサメタゾン	20mg/body	p.o.			
	レブラミド	レナリドミド	25mg/body	p.o.	d1-21		
DMPB	ダラキューロ	ダラツムマブ	1800mg	皮下注	d1,8,15,22,29,36	21 日 (9コース以降 は28日)	多発性骨髄腫
	デカドロン	デキサメタゾン	16.5mg/body	15 分	d1,8,15,22,29,36		
	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>	s.c.	d1,4,8,11,22,25,29,32		
	アルケラン	メルファラン	9mg/m <sup>2</sup>	p.o.	d1-4 <sup>2)</sup>		
	プレドニン	プレドニゾン	60mg/m <sup>2</sup>	p.o.	d2-4 <sup>2)</sup>		
DVd	ダラキューロ	ダラツムマブ	1800mg	皮下注	d1,8,15	21-28 日	多発性骨髄腫
	デカドロン	デキサメタゾン	20mg/body	p.o.			
	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下.	d1,4,8,11		
EPD	エムプリシティ	エロツズマブ	10mg/kg	点滴静注	d1,8,15,22(1-2コース) d1(3コース以降)	28 日	多発性骨髄腫
	デカドロン	デキサメタゾン	40 mg/body	内服 or 注射	d1,8,15,22)		
	ボマリスト	ボマリドミド	4mg/body	内服	連日		
VPD	デカドロン	デキサメタゾン	20 mg/body	内服	d1,2,4,5,8,9,11,12	21 日	多発性骨髄腫
	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注	d1,4,8,11		
	ボマリスト	ボマリドミド	4mg/body	内服	連日		
IsaPd	サークリサ	イサツキシマブ	10mg/kg		d1,8 <sup>1)</sup> ,15,22 <sup>1)</sup>	28 日	多発性骨髄腫
	デカドロン	デキサメタゾン	40mg/body*	15 分	d1,8,15,22		
	ボマリスト	ボマリドミド	4mg/body		d1-21		
DKD	ダラキューロ	ダラツムマブ	1800mg	皮下注	d1,8 <sup>1)</sup> ,15 <sup>2)</sup> ,22 <sup>1)</sup>	28 日	多発性骨髄腫
	デカドロン	デキサメタゾン	16.5 mg	15 分	d1,8 <sup>1)</sup> ,15 <sup>2)</sup> ,22 <sup>1)</sup>		
	ソルメドロール	ソルメドロール	20mg		d3 <sup>3)</sup>		
	カiproリス	カルフィゾミブ	56 <sup>5)</sup> mg/m <sup>2</sup>	30 分	d1,2,8,9,15,16		

DCyborD	ダラキューロ	ダラツムマブ	1800mg	皮下			AL アミロイドーシス
	デカドロン	デキサメタゾン	20mg/body <sup>1)</sup>	内服			
	エンドキサン	シクロホスファミド	300mg/m <sup>2</sup>	内服			
	ベルケイド	ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下注			
DPd	ダラキューロ	ダラツムマブ	1800mg	皮下			多発性骨髄腫
	デカドロン	デキサメタゾン	40mg/body*	内服			
	ポマリスト	ポマリドミド	4mg/body	内服			
IsaKd	サークリサ	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴			多発性骨髄腫
	デカドロン	デキサメタゾン	20mg/body	内服			
	カイトロリス	カルフィルゾミブ	56mg/m <sup>2</sup>	点滴			
Isa+d、Isa	サークリサ	イサツキシマブ	10mg/kg	点滴			多発性骨髄腫

[血液内科へ戻る](#)

[Top へ戻る](#)

## 《骨髄異形成症候群》

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
AZA5-2	ビダーザ	アザシチジン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 10分 または 皮下注	d1-5,8,9	28日	骨髄異形成症候群

## 《その他》

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
MIT 単剤	ノバントロン	ミトキサントロン	14mg/m <sup>2</sup>	1hr	d1	21-28日	悪性リンパ腫 急性白血病
サイメリン単剤	サイメリン	ラニムスチン	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1	28日	骨髄増殖性疾患
リツキサン単剤 weekly	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 4-8hr	d1	7日	ITP
Triple 髄注	デキサート	デカドロン	3.3 mg/body	髄注	d1		
	メントレキセート	メトトレキサート	15 mg/body	髄注	d1		
	キロサイド	シタラビン	40 mg/body	髄注	d1		



抗 CCR4 抗体療法	ポテリジオ	モガリズマブ	1 mg/kg	点滴静注 2 時間	d1	7 日間隔、8 回	CCR4 抗体陽性 成人 T 細胞性白血病リンパ腫
DEX+VP-16+CyA	ベプシド	エトポシド	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d1,4,8,11,15,22,29,36,43,50	52 日間	血球貪食症候群
	サンディミュン	シクロスポリン	6mg/kg	内服	d1-52		
	デキサート	デキサメタゾン	10mg/m <sup>2</sup> 5mg/m <sup>2</sup> 2.5mg/m <sup>2</sup> 1.25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1-14 d15-29 d30-44 d45-52		
Benda 療法 (CLL)	トレアキシシ	ベンダムスチン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1hr	d1,2 (8 コース)	21 日	慢性リンパ性白血病
FMC 療法	ノバントロン	ミトキサントロン	8mg/m <sup>2</sup>	30 分	d1	28 日	T細胞前リンパ球性白血病
	フルダラ	フルダラビン	25 mg/m <sup>2</sup>	30 分	d1-3		
	エンドキサン	シクロホスファミド	200 mg/m <sup>2</sup>	1 時間	d1-3		
FCR	リツキサン	リツキシマブ	375mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 4-8 時間	d1	28 日	CLL
	フルダラ	フルダラビン	25 mg/m <sup>2</sup>	30min	d1-3 (1 コース目は d2-4)		
	エンドキサン	シクロホスファミド	250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1-3 (1 コース目は d2-4)		
Rituximab (CLL)	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup> (2 回目以降 500mg/m <sup>2</sup> )	4-8hr	d1	7 日	CLL
VenR		リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup> ※	4~8 時間	d1	28 日	CLL
		ベネトクラクス	400mg/body	内服	連日		

[血液内科へ戻る](#)

[Top へ戻る](#)

## 呼吸器

### プラチナ製剤併用 CDDPレジメン

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
CDDP+CPT-11 (small)	トポテシン	イリノテカン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1,8,15	28 日	小細胞肺癌
	ランダ	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1		

CDDP+VP-16	エトポシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1,2,3	21 日	肺癌
	ランダ	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1		
CDDP+VNR	ロゼウス	ビノレルビン	25 mg/m <sup>2</sup>	5 分以内	d1,8	21 日	非小細胞肺癌
	ランダ	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1		
CDDP+VNR RT 併用	ロゼウス	ビノレルビン	20 mg/m <sup>2</sup>	5 分以内	d1,8	28 日	非小細胞肺癌
	ランダ	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1		
CDDP+PEM	アリムタ	ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 10 分	d1	21 日	非小細胞肺癌 悪性胸膜中皮腫
	ランダ	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1		
CDDP+DTX RT 併用	ドセタキセル	ドセタキセル	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1,8,29,36	56 日	非小細胞肺癌
	ランダ	シスプラチン	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1,8,29,36		
Pembro+PEM+CDDP	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	30 分	d1	21 日 (4 サイクル後 Pembro+PEM を 増悪まで投与)	非小細胞肺癌
	アリムタ	ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	10 分	d1		
	ランダ	シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	60 分	d1		
Durv+CDDP+VP-16	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg <sup>*</sup>	60 分	d1	21 日	小細胞肺癌
	ペプシド	エトポシド	80mg/m <sup>2</sup>	60 分	d1, d2, d3		
	ランダ	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	60 分	d1		
Necitumumab+CDDP+GEM	ポートラーザ	ネシツムマブ	800mg/body	60 分	d1,d8	21 日	扁平上皮肺癌
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30 分	d1,d8		
	ランダ	シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>	60 分	d1		

## CBDCA レジメン

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
CBDCA+VP-16	エトポシド	エトポシド	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1,2,3	21 日	小細胞肺癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 60 分	d1		
CBDCA(AUC5)+CPT-11	トポテシン	イリノテカン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1,8,15	28 日	小細胞肺癌 非小細胞肺癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 60 分	d1		
CBDCA(AUC2)+CPT-11	トポテシン	イリノテカン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1,8	21 日	小細胞肺癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 2	点滴静注 30 分	d1,8		
CBDCA+3wPTX	パクリタキセル	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 180 分	d1	21 日	非小細胞肺癌

	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 60分	d1		小細胞肺癌
CBDCA+wPTX	パクリタキセル	パクリタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	d1,8,15	28日	非小細胞肺癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 60分	d1		
wCBDCA(AUC2)+PTX RT併用	パクリタキセル	パクリタキセル	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	d1,8,15,22,29,36	42日	非小細胞肺癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 2	点滴静注 60分	d1,8,15,22,29,36		
CBDCA+weekly nab-PTX	アブラキサン	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,8,15	21日	非小細胞肺癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 60分	d1		
CBDCA+GEM	ゲムシタピン	ゲムシタピン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,8	21日	非小細胞肺癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 60分	d1		
CBDCA+PEM	アリムタ	ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 10分	d1	21日	非小細胞肺癌 非扁平上皮癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 60分	d1		
CBDCA+S1	ティーエスワン	テガフル ギメラシル オテラシル	80 mg/m <sup>2</sup> /day	経口 1日2回朝夕食後	d1-14	21日	非小細胞肺癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 60分	d1		
Atezo+Bev+CBDCA+PTX (ABCP)	テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg/body	30分(初回60分)	d1	21日 (4-6コース終了 後 Atezo と Bev のみ PD に至るま で投与を行う)	非小細胞肺癌
	アバステン	ベバシズマブ	15mg/kg	初回90分 2回目60分 以後30分	d1		
	パクリタキセル	パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	3時間	d1		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	1時間	d1		
Pembro+nab-PTX+CBDCA	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	d1	21日	非小細胞肺癌
	アブラキサン	アルブミン懸濁型 パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	30分	d1、d8、d15		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	60分	d1		
Pembro+PTX+CBDCA	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	d1	21日	非小細胞肺癌
	パクリタキセル	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	3時間	d1		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	60分	d1		
Pembro+PEM+CBDCA	キイトルーダ	ペムブロリズマ ブ	200mg/body	30分	d1	21日 (4サイクル後、 Pembro+PEMを	非小細胞肺癌
	アリムタ	ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	10分	d1		

	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	60 分	d1	増悪まで投与)	
Atezo+CBDCA+VP-16	テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg	30 分(初回 60 分)	d1	21 日 4 コース終了後 Atezo を PD まで 投与	小細胞肺癌
	ペプシド	エトポシド	80mg/m <sup>2</sup>	60 分	d1		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	60 分	d1		
Durv+CBDCA+VP-16	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg <sup>**</sup>	60 分	d1	21 日	小細胞肺癌
	ペプシド	エトポシド	80mg/m <sup>2</sup>	60 分	d1, d2, d3		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC5	60 分	d1		
Nivo+Ipi+CBDCA+PEM	オプジーボ	ニボルマブ	360mg/body	30 分	d1、22	42 日	非小細胞肺癌
	ヤーボイ	イピリムマブ	1mg/kg	30 分	d1		
	アリムタ	ペメトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	10 分	d1、22		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	60 分	d1、22		
Nivo+Ipi+CBDCA+PTX	オプジーボ	ニボルマブ	360mg/body	30 分	d1、22	42 日	非小細胞肺癌
	ヤーボイ	イピリムマブ	1mg/kg	30 分	d1		
	パクリタキセル	パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	10 分	d1、22		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	60 分	d1、22		

## 分子標的薬併用レジメン

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
Erlotinib+Bev	アバステン	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注 30 分 (初回 90 分) (2 回目 60 分)	d1	21 日	非小細胞肺癌
	タルセバ	エルロチニブ	150mg/day	食間	d1-21		
CDDP+MTA+Bev	アリムタ	ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 10 分	d1	21 日	非小細胞肺癌 非扁平上皮癌
	ランダ	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1		
	アバステン	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注 30 分 (初回 90 分) (2 回目 60 分)	d1		
CBDCA+MTA+Bev	アリムタ	ペメトレキセド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 10 分	d1	21 日	非小細胞肺癌 非扁平上皮癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注 60 分	d1		
	アバステン	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注 30 分 (初回 90 分) (2 回目 60 分)	d1		
DTX+RAM	サイラムザ	ラムシルマブ	10 mg/kg	点滴静注 60 分	d1	21 日	非小細胞肺癌

	ドセタキセル	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1		
Gefinib + RAM	サイラムザ	ラムシルマブ	10mg/kg	60 分	d1	14 日	非小細胞肺癌
	イレッサ	ゲフィチニブ	250mg	内服	d1-d14		
Erlotinib + RAM	サイラムザ	ラムシルマブ	10mg/kg	60 分	d1	14 日	非小細胞肺癌
	タルセバ	エルロチニブ	150mg	内服	d1-d14		

## 単剤療法、その他

### 免疫チェックポイント阻害薬

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
Nivolumab	オプジーボ	ニボルマブ	240mg	30 分	d1	14 日	非小細胞肺癌
Pembrolizumab	キイトルーダ	ペンブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30 分	d1	21 日	非小細胞肺癌
Atezolizumab	テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg	30 分(初回 60 分)	d1	21 日	非小細胞肺癌
Durvalumab	イミフィンジ	デュルバルマブ	10mg/kg	60 分	d1	14 日	非小細胞肺癌
Nivo+Ipi(360/1)	オプジーボ	ニボルマブ	360mg/body	30 分	d1、22	42 日	非小細胞肺癌 悪性中皮腫
	ヤーボイ	イピリムマブ	1mg/kg	30 分	d1		

### 細胞障害性抗癌剤

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
3wDOC	ドセタキセル	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1	21 日	非小細胞肺癌
VNR	ロゼウス	ビノレルビン	25 mg/m <sup>2</sup>	急速静注 5 分	d1,8	21 日	非小細胞肺癌
CPT-11	トポテシン	イリノテカン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1,8,15	28 日	非小細胞肺癌 小細胞肺癌
AMR	カルセド	アムルビシン	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 5 分	d1,2,3	21 日	非小細胞肺癌 小細胞肺癌
MTA	アリムタ	ペメトレキシド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 10 分	d1	21 日	非小細胞肺癌 非扁平上皮癌
Nogitecan	ハイカムチン	ノギテカン	1.0 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,2,3,4,5,	21 日	小細胞肺癌
GEM	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8	21 日	非小細胞肺癌
BLM 心膜癒着	ブレオ	ブレオマイシン	初回 15mg/body 以降 10mg/body	心嚢ドレーンより投 与し約 2 時間クラン プ	d1	48 時間	がん性心膜炎

乳腺・内分泌外科

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
EC(90)	ファルモルピシン	エピルピシン	90 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	d1	21日	乳癌
	エンドキサン	シクロホスファミド	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	d1		
EC(75)	ファルモルピシン	エピルピシン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	d1	21日	乳癌
	エンドキサン	シクロホスファミド	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	d1		
AC(60)	アドリアシン	ドキソルピシン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	d1	21日	乳癌
	エンドキサン	シクロホスファミド	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	d1		
3wHER+3wDOC(75)	ハーセプチン	トラスツズマブ	6mg/kg (初回 8mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1	21日	乳癌
	ドセタキセル	ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	d1		
wHER+3wDOC(75)	ハーセプチン	トラスツズマブ	2mg/kg (初回 4mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1,8,15	21日	乳癌
	ドセタキセル	ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	d1		
wHER+wPTX(80)	ハーセプチン	トラスツズマブ	2mg/kg (初回 4mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1	7日	乳癌
	パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	d1		
3wPER+3wHER+3wDOC(75)	パージェタ	ペルツズマブ	420 mg/body (初回 840 mg/body)	点滴静注 30分 (初回 60分)	d1	21日	乳癌
	ハーセプチン	トラスツズマブ	6mg/kg (初回 8mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1		
	ドセタキセル	ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	d1		
3wPER+3wHER+wPTX(80)	パージェタ	ペルツズマブ	420 mg/body (初回 840 mg/body)	点滴静注 30分 (初回 60分)	d1	21日	乳癌
	ハーセプチン	トラスツズマブ	6mg/kg (初回 8mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1		
	パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	d1,8,15		
(限)3wPER+3wHER+HAL	パージェタ	ペルツズマブ	420 mg/body (初回 840 mg/body)	点滴静注 30分 (初回 60分)	d1	21日	乳癌
	ハーセプチン	トラスツズマブ	6mg/kg (初回 8mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1		

	ハラヴェン	エリブリン	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 5分	d1,8		
3wTC(75/600)	エンドキサン	シクロホスファミド	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15分	d1	21日	乳癌
	ドセタキセル	ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	d1		
wHER+CBDCA+3wPTX	ハーセプチン	トラスツズマブ	2mg/kg (初回 4mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1,8,15	21日	乳癌
	パクリタキセル	パクリタキセル	175 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 180分	d2		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注 60分	d2		
wHER+CBDCA+3wDOC	ハーセプチン	トラスツズマブ	2mg/kg (初回 4mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1,8,15	21日	乳癌
	ドセタキセル	ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	d1		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注 60分	d1		
wHER+GEM	ハーセプチン	トラスツズマブ	2mg/kg (初回 4mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1,8,15	21日	乳癌
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,8		
wHER+VNB	ハーセプチン	トラスツズマブ	2mg/kg (初回 4mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1,8,15	21日	乳癌
	ロゼウス	ビノレルビン	25 mg/m <sup>2</sup>	急速静注 5分以内	d1,8		
3wHER+VNB	ハーセプチン	トラスツズマブ	6mg/kg (初回 8mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1	21日	乳癌
	ロゼウス	ビノレルビン	25 mg/m <sup>2</sup>	急速静注 5分以内	d1,8		
3wHER+HAL	ハーセプチン	トラスツズマブ	6mg/kg (初回 8mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1	21日	乳癌
	ハラヴェン	エリブリン	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 5分	d1,8		
3wHER+XEL(B)	ハーセプチン	トラスツズマブ	6mg/kg (初回 8mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1	21日	乳癌
	ゼローダ	カペシタビン	2500 mg/m <sup>2</sup> /day	朝夕食後	d1-14		
wHER+XEL(B)	ハーセプチン	トラスツズマブ	2mg/kg (初回 4mg/kg)	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1,8,15	21日	乳癌
	ゼローダ	カペシタビン	2500 mg/m <sup>2</sup> /day	朝夕食後	d1-14		
PTX(80)+BEV	アバスチン	ベバシツマブ	10mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1,15	28日	乳癌
	パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	d1,8,15		
KAD(3w)	カドサイラ	トラスツズマブ-エム タンシン	3.6mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分)	d1	21日	乳癌

3wDOC(75)	ドセタキセル	ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1	21 日	乳癌
3wDOC(60)	ドセタキセル	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1	21 日	乳癌
3wHER	ハーセプチン	トラスツズマブ	6mg/kg (初回 8mg/kg)	点滴静注 30 分 (初回 90 分)	d1	21 日	乳癌
wHER	ハーセプチン	トラスツズマブ	2mg/kg (初回 4mg/kg)	点滴静注 30 分 (初回 90 分)	d1	7 日	乳癌
HAL	ハラヴェン	エリブリン	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 5 分	d1,8	21 日	乳癌
wPTX(80)	パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1	7 日	乳癌、頭頸部癌
GEM+3wPTX	パクリタキセル	パクリタキセル	175 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 180 分	d1	21 日	乳癌
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8		
GEM(1250)	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8	21 日	乳癌
nab-PTX	アブラキサン	パクリタキセル(アル ブミン懸濁型)	260 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1	21 日	乳癌
VNB	ロゼウス	ビノレルビン	25 mg/m <sup>2</sup>	急速静注 5 分以内	d1,8	21 日	乳癌
CPT-11	トポテシン	イリノテカン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1,8,15	35 日	乳癌
FEC(100)	5-FU	5-フルオロウラシル	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15 分	d1	21 日	乳癌
	ファルモルピシン	エピルピシン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15 分	d1		
	エンドキサン	シクロホスファミド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15 分	d1		
FEC(75)	5-FU	5-フルオロウラシル	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15 分	d1	21 日	乳癌
	ファルモルピシン	エピルピシン	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15 分	d1		
	エンドキサン	シクロホスファミド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15 分	d1		
cCMF	エンドキサン	シクロホスファミド	100 or 150 mg/body/day	経口	d1-14	28 日	乳癌
	メソトレキセート	メソトレキセート	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15 分	d1,8		
	5-FU	5-フルオロウラシル	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15 分	d1,8		
BLM 心膜癒着	ブレオ	ブレオマイシン	初回 15mg/body 以降 10mg/body	心嚢ドレーンより投与 し約 2 時間クランプ	d1	48 時間	がん性心膜炎
CVD	エンドキサン	シクロホスファミド	750mg/m <sup>2</sup>	30min	d1	21 日	悪性褐色細胞腫
	オンコピン	ピンクリスチン	1.4mg/m <sup>2</sup>	全開	d1		
	ダカルバジン	ダカルバジン	600mg/m <sup>2</sup>	15min	d1,2		
dd-EC(90/600)	ファルモルピシン	エピルピシン	90 mg/m <sup>2</sup>	15 分	d1	14 日	乳癌
	エンドキサン	シクロホスファミド	600 mg/m <sup>2</sup>	15 分	d1		
biweeklyPTX(175)	パクリタキセル	パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	3hr	d1	21 日	乳癌



Atezo+nabPTX	テセントリク	アテゾリズマブ	840mg	初回 60 分 2 回目以降 30 分	d1,15	21 日	乳癌
	アブラキサン	nab パクリタキセル	100mg/m2	60 分	d1, d8, d15		
T-DXd	エンハーツ	T-DXd	5.4 mg/kg	90 分*	d1	21 日	乳がん
Pembro+wPTX (80)	キイトルーダ	ペムプロリズマブ	200mg	30 分	d1,22,43,64	84 日	乳がん
	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m2	60 分	d1, d8,d15,29,、 36,43,57,64,71		
Pembro+CBDCA+GEM	キイトルーダ	ペムプロリズマブ	200mg	30 分	d1	21 日	乳がん
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m2	60 分	d1,8		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC2	30 分	d1,8		
TCHP	パージェタ	ペルツズマブ	420 mg/body**	60 分*	d1	21 日	乳がん
	ハーセプチン	トラスツズマブ	6 mg/kg***	90 分*	d1		
	ドセタキセル	ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	60 分	d1		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC6	60 分	d1		

[Top へ戻る](#)

## 泌尿器科

### 前立腺癌

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
DTX(70)	ドセタキセル	ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1	21 日	前立腺癌
Cabazitaxel	ジェブタナ	カバジタキセル	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1	21 日	前立腺癌

### 尿路上皮癌

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
GC	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8,15	28 日	尿路上皮癌
	ランダ	シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2-3 時間	d2		
GC(CBDCA)	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8,15	28 日	尿路上皮癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 2 時間	d1 or d2		
PG	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8	21 日	尿路上皮癌
	パクリタキセル	パクリタキセル	175 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d1		

M-VAC	メソトレキセート	メソトレキサート	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15 分	d1,15,22	28 日	尿路上皮癌
	エクザール	ビンブラスチン	3 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 15 分	d2,15,22		
	ランダ	シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d2		
	アドリアシン	ドキシソルビシン	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d2		
THP(勝注)	テラルビシン	ピラルビシン	30 mg	膀胱内注入	d1	7 日	尿路上皮癌
EPI(勝注)	ファルモルビシン	エピルビシン	40 mg	膀胱内注入	d1	7 日	表在性膀胱癌
BCG(勝注)	イムノブラダー	BCG (生カルメット・ゲラン菌)	80 mg	膀胱内注入 膀胱内保持 1-2 時間	d1	7 日	表在性膀胱癌 膀胱上皮内癌
MMC(勝注)	マイトマイシン	マイトマイシン C	30 mg	膀胱内注入 膀胱内保持 30-60 分	d1	7 日	表在性膀胱癌
CDDP+THP (動注)	ランダ	シスプラチン	100 mg/m <sup>2</sup>	動注	d1	1 回のみ	尿路上皮癌
	テラルビシン	ピラルビシン	40 mg/m <sup>2</sup>	動注	d1		
Pembrolizumab	キイトルーダ	ペンブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30 分	d1	21 日	尿路上皮癌
3wGC	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	d1,8	21 日	尿路上皮癌
	シスプラチン	ランダ	70mg/m <sup>2</sup>	1 時間	d2		
ddM-VAC	メソトレキセート	メソトレキサート	30 mg/m <sup>2</sup>	15 分	d1	14 日	尿路上皮癌
	エクザール	ビンブラスチン	3 mg/m <sup>2</sup>	15 分	d2		
	ランダ	シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	1 時間	d2		
	アドリアシン	ドキシソルビシン	30 mg/m <sup>2</sup>	15 分	d2		
Avelumab	バベンチオ	アベルマブ	10mg/kg	60 分	d1	14 日	尿路上皮癌
Enfortumab Vedtin	パドセフ	エンホルツマブ ベドチン	1.25 mg/kg	30 分	d1,d8,d15	28 日	尿路上皮癌

## 精巣腫瘍

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
BEP	ブレオ	ブレオマイシン	30 mg/body	緩徐に静注	d1,8,15	21 日	胚細胞腫瘍
	エトポシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1-5		
	ランダ	シスプラチン	20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1-5		
EP	エトポシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1-5	21 日	胚細胞腫瘍
	ランダ	シスプラチン	20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1-5		
TIP	パクリタキセル	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d1	21 日	精巣腫瘍

	イホマイド	イホスファミド	1500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d2-5		
	ランダ	シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d2-5		
JEB	エトポシド	ベプシド	120mg/m <sup>2</sup>	2 時間	day 1-3	21-28 日	胚細胞性腫瘍
	カルボプラチン	カルボプラチン	600mg/m <sup>2</sup>	2 時間	day 2		
	ブレオマイシン	ブレオ	15mg/m <sup>2</sup>	15 分	day 3		
TIN	パクリタキセル	パクリタキセル	200mg/m <sup>2</sup>	3 時間	day1	21 日	精巣腫瘍
	イホマイド	イホスファミド	1200mg/m <sup>2</sup>	15 分	day2-6		
	アクプラ	ネダプラチン	100mg/m <sup>2</sup>	2 時間	day2		
VIP	ベプシド	エトポシド	75mg/m <sup>2</sup>	1 時間	day1-5	21 日	精巣腫瘍
	イホマイド	イホスファミド	1200mg/m <sup>2</sup>	30 分	day1-5		
	ランダ	シスプラチン	20mg/m <sup>2</sup>	1 時間	day1-5		
CBDCA	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 7	1 時間	d1	21 日	精巣腫瘍
GEMOX	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30min	d1, d8	21 日間	胚細胞腫・精巣がん
	エルプラット	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	2hr	d1		

## 腎細胞癌

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
TEM	トーリセル	テムシロリムス	25 mg/body	点滴静注 1 時間	d1	7 日	腎細胞癌
Nivolumab	オプジーボ	ニボルマブ	240mg	30 分	d1	14 日	腎細胞癌
Axitinib+Pembro	キイトルーダ	ペンブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30 分	d1	21 日	腎細胞癌
	インライタ	アキシチニブ	10mg	内服	連日		
Axitinib+Avelumab	アベルマブ	バベンチオ	10mg/kg	60 分	d1	14 日	腎細胞癌
	インライタ	アキシチニブ	10mg	内服	連日		
Nivo+Cabozantinib	オプジーボ	ニボルマブ	240mg*	60 分	d1	14 日 28 日	腎細胞癌
	カボメティックス	カボザンチニブ	40mg	内服	d1		
Lenvatinib + Pembrolizumab	キイトルーダ	ペンブロリズマブ	200mg*	30 分	d1	21 日	腎細胞癌
	レンビマ	レンバチニブ	20mg	内服	連日		
Nivo + Ipi(RCC)併用療法	オプジーボ	ニボルマブ	240mg	30min	d1	21 日	腎細胞癌
	ヤーボイ	イピリムマブ	1mg/kg	30min	d1(4 コースまで)		

[Top へ戻る](#)

## 婦人科

## 卵巣癌、子宮体癌、子宮頸癌、子宮平滑筋肉腫

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
TriweeklyTP+Bev	アバスタチン	ベバシツマブ	15 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	21日	子宮頸癌
	パクリタキセル	パクリタキセル	180 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3時間	d1		
	ランダ	シスプラチン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1		
TriweeklyTC+Bev	アバスタチン	ベバシツマブ	15 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	21日	卵巣癌 子宮頸癌
	パクリタキセル	パクリタキセル	180 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3時間	d1		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5-6	点滴静注 1時間	d1		
dd-TC+Bev	アバスタチン	ベバシツマブ	15 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	21日	卵巣癌 (ddTC6 コース施行後、 Bev 継続)
	パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1,8,15		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5-6	点滴静注 1時間	d1		
GEM+CBDCA+Bev	アバスタチン	ベバシツマブ	15 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	21日	卵巣癌
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1,8		
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 4	点滴静注 1時間	d1		
Doxil+CBDCA	ドキシル	リポソーム化 ドキシソルビシン	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90分	d1	28日	卵巣癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 1時間	d1		

Doxil+Bev	アバステン	ベバシツマブ	10 mg/kg	点滴静注 初回 90 分 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分	d1,15	28 日	卵巣癌
	ドキシル	リポソーム化 ドキシロビシン	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1		
CPT-11+Bev	アバステン	ベバシツマブ	15 mg/kg	点滴静注 初回 90 分 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分	d1	21 日	卵巣癌
	トポテシン	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1		
AP	アドリアシン	ドキシロビシン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 10 分	d1	28 日	子宮体癌
	ランダ	シスプラチン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1		
dd-TC(3 投 0 休)	パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1,8,15	21 日	卵巣癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注 1 時間	d1		
dd-TC(3 投 1 休)	パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1,8,15	28 日	卵巣癌 子宮体癌 子宮頸癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注 1 時間	d1		
Triweekly TC	パクリタキセル	パクリタキセル	180 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d1	21 日	卵巣癌 子宮体癌 子宮頸癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注 1 時間	d1		
Monthly TC	パクリタキセル	パクリタキセル	180 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d1	28 日	卵巣癌 子宮体癌 子宮頸癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注 1 時間	d1		
Weekly TP	パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1,8,15	21 日	子宮頸癌
	ランダ	シスプラチン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1		
Monthly TP	パクリタキセル	パクリタキセル	180 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d1	28 日	卵巣癌 子宮頸癌
	ランダ	シスプラチン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1		
Weekly PTX+NDP	パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1,8,15	28 日	子宮頸癌
	アクプラ	ネダプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1		
Triweekly PTX+NDP	パクリタキセル	パクリタキセル	175 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d1	21 日	子宮頸癌
	アクプラ	ネダプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1		
Weekly DP	ドセタキセル	ドセタキセル	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1,8,15	28 日	卵巣癌 子宮体癌
	ランダ	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1		
Monthly DP	ドセタキセル	ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1	28 日	卵巣癌

	ランダ	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1		子宮体癌
Weekly DC	ドセタキセル	ドセタキセル	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1,8,15	28 日	卵巣癌 子宮体癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注 1 時間	d1		
Monthly DC	ドセタキセル	ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1	28 日	卵巣癌 子宮体癌 子宮頸癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 6	点滴静注 1 時間	d1		
CPT-11+CDDP	トポテシン	イリノテカン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1,8,15	28 日	卵巣癌 神経内分泌腫瘍
	ランダ	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1		
CPT-11 + CBDCA	トポテシン	イリノテカン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1,8	28 日	子宮頸癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 1 時間	d1		
CPT-11 + NDP	トポテシン	イリノテカン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1,8,15	28 日	子宮頸癌
	アクプラ	ネダプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1		
Nogitecan + CDDP	ハイカムチン	ノギテカン	0.75 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1-5	28 日	卵巣癌
	ランダ	シスプラチン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1		
GEM + CBDCA	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8	28 日	卵巣癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 4	点滴静注 1 時間	d1		
DOC+GEM	ドセタキセル	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d8	21 日	子宮平滑筋肉腫
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8		
Doxil 単剤	ドキシル	リポソーム化 ドキシソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1	28 日	卵巣癌
DOC(70)	ドセタキセル	ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1	21 日	卵巣癌
ADM 単剤	アドリアシン	ドキシソルビシン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 10 分	d1	28 日	子宮平滑筋肉腫
Weekly PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1,8,15	28 日	卵巣癌 子宮体癌 子宮頸癌
Monthly PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	180 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d1	28 日	卵巣癌 子宮頸癌 子宮体癌
triweekly PTX	パクリタキセル	パクリタキセル	180 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d1	21 日	卵巣癌
CPT-11 単剤	トポテシン	イリノテカン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1,8,15	28 日	卵巣癌 子宮体癌 子宮頸癌
GEM 単剤	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1,8,15	28 日	卵巣癌

Nogitecan 単剤	ハイカムチン	ノギテカン	1.25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1-5	28日	卵巣癌
CDDP 単剤	ランダ	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	2時間	d1	21日	卵巣癌
CCRT(CDDP)	ランダ	シスプラチン	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1	7日	子宮頸癌
WeeklyNDP+RT	アクプラ	ネダプラチン	35 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1	7日	子宮頸癌
NDP 単剤	アクプラ	ネダプラチン	80 mg/m <sup>2</sup> (max 90mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注 1時間	d1	28日	卵巣癌 子宮頸癌
IFM+CDDP	イホマイド	イホスファミド	5000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24時間	d1	21日	子宮頸癌
	ランダ	シスプラチン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1		
IFM	イホマイド	イホスファミド	1200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1-5	28日	子宮頸癌
BEP	エトポシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1-5	21日	胚細胞腫瘍
	ランダ	シスプラチン	20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1-5		
	プレオ	プレオマイシン	30 mg/body	緩徐に静注	d2,9,16		
PVB	エクザール	ビンブラスチン	0.15 mg/kg	全開	d1,2	28日	卵巣顆粒膜細胞腫
	ランダ	シスプラチン	20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1-5		
	プレオ	プレオマイシン	30 mg/body	全開	d2		
	プレオ	プレオマイシン	15 mg/body	全開	d15		
IFM 1.5g/m <sup>2</sup>	イホマイド	イホスファミド	1500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1-5	28日	子宮平滑筋肉腫
IFM+PTX	イホマイド	イホスファミド	1.6g/m <sup>2</sup>	60分	d1-3	21日	子宮癌肉腫
	パクリタキセル	パクリタキセル	135mg/m <sup>2</sup>	180分	d1		
Olaparib+Bev	アバスチン	ベバシズマブ	15mg/kg	90分(※)	d1	21日	卵巣がん
	リムパーサ	オラパリブ	600mg	内服	連日		
Lenvatinib + Pembrolizumab	キイトルーダ	ペンブロリズマブ	200mg*	30分	d1	21日	子宮体癌
	レンビマ	レンパチニブ	20mg	内服	連日		

[Top へ戻る](#)

## 絨毛性疾患

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
MEA	メソトレキセート	メトトレキサート	150 mg/body	急速静注	d1	28日	絨毛性疾患
	メソトレキセート	メトトレキサート	300 mg/body	点滴静注 4時間	d1		

	エトポシド	エトポシド	100 mg/body	点滴静注 1 時間	d1-5		
	コスメゲン	アクチノマイシン D	0.5mg/body	急速静注	d1-5		
	ロイコボリン	ホリナート Ca	15 mg/body	急速静注	d2,3		
MTX+CF	メトトレキサート	メトトレキサート	1 mg/kg	筋注	d1,3,5,7	14 日	絨毛性疾患
	ロイコボリン	ホリナート Ca	0.1 mg/kg	筋注	d2,4,6,8		
MTX+actinomycinD	メトトレキサート	メトトレキサート	20 mg/body	筋注	d1-4	14 日	絨毛性疾患
	コスメゲン	アクチノマイシン D	0.5mg/body	急速静注	d1-4		
MTX (50)	メトトレキサート	メトトレキサート	50 mg/m2	筋注	d1	7 日 (d4-7 hCG ↑ 時再投与)	異所性妊娠
MTX 単剤	メトトレキサート	メトトレキサート	20 mg/body	筋注	d1-5	14 日	絨毛性疾患 (限定: 異所性妊娠)
ActinomycinD	コスメゲン	アクチノマイシン D	0.5mg/body	静注	d1-5	14 日	絨毛性疾患

[Top へ戻る](#)

## 耳鼻咽喉科、歯科・口腔外科

### 頭頸部癌

#### 免疫チェックポイント阻害薬

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
Nivolumab	オプジーボ	ニボルマブ	240mg	30 分	d1	14 日	頭頸部癌
Pembrolizumab	キイトルーダ	ペンブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30 分	d1	21 日	頭頸部癌
FP+Pembro	ランダ	シスプラチン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1	21 日	頭頸部癌
	5-FU	5-フルオロウラシル	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1-4		
	キイトルーダ	ペンブロリズマブ	200mg/body	30 分	d1		
CBDCA+5-FU+Pembro	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 2 時間	d1	21 日	頭頸部癌
	5-FU	5-フルオロウラシル	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1-4		
	キイトルーダ	ペンブロリズマブ	200mg/body	30 分	d1		

#### セツキシマブ併用



レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
FP(CDDP+5-FU)+Cmab	ランダ	シスプラチン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1	21日	頭頸部癌
	5-FU	5-フルオロウラシル	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24時間	d1-4		
	アービタックス	セツキシマブ	250 mg/m <sup>2</sup> (初回 400mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注 60分 (初回 2時間)	d1,8,15		
CBDCA+5-FU+Cmab	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 2時間	d1	21日	頭頸部癌
	5-FU	5-フルオロウラシル	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24時間	d1-4		
	アービタックス	セツキシマブ	250 mg/m <sup>2</sup> (初回 400mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注 60分 初回 2時間	d1,8,15		
PCE	パクリタキセル	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	60分	d1,8	21日	頭頸部癌
	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC2.5	60分	d1,8		
	アービタックス*	セツキシマブ*	250mg/m <sup>2</sup>	60分	d1,8,15		
wPAC80+Cmab	アービタックス	セツキシマブ	250 mg/m <sup>2</sup> (初回 400mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注 60分 (初回 2時間)	d1	7日	頭頸部癌
	パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分	d1		
Cmab biweekly	アービタックス	セツキシマブ	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60分 (初回 2時間)	d1	14日	頭頸部癌

## 放射線併用

Cmab+RT	アービタックス	セツキシマブ	250 mg/m <sup>2</sup> (初回 400mg/m <sup>2</sup> )	点滴静注 60分 初回 2時間	d1	7日	頭頸部癌
Triweekly CDDP+RT	ランダ	シスプラチン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1	21日	頭頸部癌
weekly CDDP+RT	ランダ	シスプラチン	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1,8,15,22,29,36,43	49日	頭頸部癌

## その他

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
FP(1000/100)	ランダ	シスプラチン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1	28日	頭頸部癌
	5-FU	5-フルオロウラシル	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24時間	d1-5		
CBDCA +5-FU	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 4	点滴静注 2時間	d1	28日	頭頸部癌
	5-FU	5-フルオロウラシル	700 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24時間	d1-5		

Monthly DTX(60)	ドセタキセル	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d1	28 日	頭頸部癌
wPTX(100)食道・頭頸部	パクリタキセル	パクリタキセル	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1,8,15,22,29,36	49 日	頭頸部癌
3wHER+3wDOC(70)	ハーセプチン	トラスツズマブ	初回 8mg/kg 2 回目以降 6 mg/kg	90 分	d1	21 日間	唾液腺癌
	ドセタキセル	ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	60 分	d1		
イルミノックス	アキシャルックス	セツキシマブサロカルタン	640mg/m <sup>2</sup>	120 分	d1	28 日	頭頸部癌

[Top へ戻る](#)

## 小児科

[ 小児 ALL ] [ 小児 AML ] [ 小児 NHL ] [ その他 ]

### 小児 ALL

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
ALL-B12 Ip	プレドニン	プレドニゾロン	15→30→60 mg/m <sup>2</sup>	内服	d1 (15mg/m <sup>2</sup> ) d2,3 (30mg/m <sup>2</sup> ) d4-7 (60mg/m <sup>2</sup> )	7 日	小児急性リンパ性白血病
	メトレキサート	メトレキサート	1 歳 8mg	2 歳 10mg	3 歳以上 12mg	髄注	d1
ALL-B12 IA2	ダウノマイシン	ダウノルピシン	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1,8	28 日	小児急性リンパ性白血病
	オンコビン	ビンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1,8,15,22		
	ロイナーゼ	L-アスパラギナーゼ	5,000 U/m <sup>2</sup>	筋注	d5,8,11,14,17,20,23,26		
	プレドニン	プレドニゾロン	60→30→15→7.5mg/m <sup>2</sup>	内服	d1-21 (60mg/m <sup>2</sup> ) d22-24 (30mg/m <sup>2</sup> ) d25-27 (15mg/m <sup>2</sup> ) d28-30 (7.5mg/m <sup>2</sup> )		
	メトレキサート	メトレキサート	1 歳 8mg	2 歳 10mg	3 歳以上 12mg	髄注	d5,(11,20),26
	キロサイド	シタラビン	20mg	26mg	30mg		
	プレドニン	プレドニゾロン	6mg	8mg	10mg		
ALL-B12 IA4	ダウノマイシン	ダウノルピシン	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 60 分	d1,8,15,22	28 日	小児急性リンパ性白血病
	オンコビン	ビンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1,8,15,22		
	ロイナーゼ	L-アスパラギナーゼ	5,000 U/m <sup>2</sup>	筋注	d5,8,11,14,17,20,23,26		

	プレドニン	プレドニゾロン	60→30→15→7.5mg/m <sup>2</sup>			内服		d1-21 (60mg/m <sup>2</sup> ) d22-24 (30mg/m <sup>2</sup> ) d25-27 (15mg/m <sup>2</sup> ) d28-30 (7.5mg/m <sup>2</sup> )		
	メトトレキサート	メトトレキサート	1歳 8mg	2歳 10mg	3歳以上 12mg	髄注	d5,(11,20),26			
	キロサイド	シタラビン	20mg	26mg	30mg					
	プレドニン	プレドニゾロン	6mg	8mg	10mg					
ALL-B12 IB	エンドキサン	シクロホスファミド	1000 mg/m <sup>2</sup>			点滴静注 60分		d1,29	35日	小児急性リンパ性白血病
	キロサイド	シタラビン	75 mg/m <sup>2</sup>			静注		d3-6,10-13,17-20,24-27		
	ロイケリン	メルカプトプリン	60 mg/m <sup>2</sup>			内服		d1-28		
	メトトレキサート	メトトレキサート	1歳 8mg	2歳 10mg	3歳以上 12mg	髄注	d10,24			
	キロサイド	シタラビン	20mg	26mg	30mg					
	プレドニン	プレドニゾロン	6mg	8mg	10mg					
ALL-B12 I <sub>B</sub> +L	エンドキサン	シクロホスファミド	1000 mg/m <sup>2</sup>			点滴静注 60分		d1,29	35日	小児急性リンパ性白血病
	ロイナーゼ	L-アスパラギナーゼ	5,000 U/m <sup>2</sup>			筋注		d3,6,10,13,17,20,24,27		
	キロサイド	シタラビン	75 mg/m <sup>2</sup>			静注		d3-6,10-13,17-20,24-27		
	ロイケリン	メルカプトプリン	60 mg/m <sup>2</sup>			内服		d1-28		
	メトトレキサート	メトトレキサート	1歳 8mg	2歳 10mg	3歳以上 12mg	髄注	d10,24			
	キロサイド	シタラビン	20mg	26mg	30mg					
	プレドニン	プレドニゾロン	6mg	8mg	10mg					
ALL-B12 I <sub>B</sub> +VL	オンコピン	ピンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>			点滴静注		d15,22	35日	小児急性リンパ性白血病
	エンドキサン	シクロホスファミド	1000 mg/m <sup>2</sup>			点滴静注 60分		d1,29		
	ロイナーゼ	L-アスパラギナーゼ	5,000 U/m <sup>2</sup>			筋注		d3,6,10,13,17,20,24,27		
	キロサイド	シタラビン	75 mg/m <sup>2</sup>			静注		d3-6,10-13,17-20,24-27		
	ロイケリン	メルカプトプリン	60 mg/m <sup>2</sup>			内服		d1-28		
	メトトレキサート	メトトレキサート	1歳 8mg	2歳 10mg	3歳以上 12mg	髄注	d10,24			

	キロサイド	シタラビン	20mg	26mg	30mg					
	プレドニン	プレドニゾン	6mg	8mg	10mg					
ALL-B12 M2	メトトレキサート	メトトレキサート	200 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 0.5 時間		d8, 22, 36, 50		56 日	小児急性リンパ性白血病
	メトトレキサート	メトトレキサート	1,800 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 23.5 時間		d8, 22, 36, 50			
	ロイケリン	メルカプトプリン	25 mg/m <sup>2</sup>		内服		d1-56			
	メトトレキサート	メトトレキサート	1 歳 8mg	2 歳 10mg	3 歳以上 12mg	髄注	d8, 22, 36, 50			
	キロサイド	シタラビン	20mg	26mg	30mg					
	プレドニン	プレドニゾン	6mg	8mg	10mg					
ALL-B12 M5	メトトレキサート	メトトレキサート	500 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 0.5 時間		d8, 22, 36, 50		56 日	小児急性リンパ性白血病
	メトトレキサート	メトトレキサート	4,500 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 23.5 時間		d8, 22, 36, 50			
	ロイケリン	メルカプトプリン	25 mg/m <sup>2</sup>		内服		d1-56			
	メトトレキサート	メトトレキサート	1 歳 8mg	2 歳 10mg	3 歳以上 12mg	髄注	d8, 22, 36, 50			
	キロサイド	シタラビン	20mg	26mg	30mg					
	プレドニン	プレドニゾン	6mg	8mg	10mg					
ALL-B12 M5+L	メトトレキサート	メトトレキサート	500 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 0.5 時間		d8, 22, 36, 50		56 日	小児急性リンパ性白血病
	メトトレキサート	メトトレキサート	4,500 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 23.5 時間		d8, 22, 36, 50			
	ロイケリン	メルカプトプリン	25 mg/m <sup>2</sup>		内服		d1-56			
	ロイナーゼ	L-アスパラギナーゼ	12,500 U/m <sup>2</sup>		筋注		d10, 24, 38, 52			
	メトトレキサート	メトトレキサート	1 歳 8mg	2 歳 10mg	3 歳以上 12mg	髄注	d8, 22, 36, 50			
	キロサイド	シタラビン	20mg	26mg	30mg					
	プレドニン	プレドニゾン	6mg	8mg	10mg					
ALL-B12 Ⅲ	デカドロン (10 歳未満)	デキサメタゾン	10 mg/m <sup>2</sup>		内服		d1-14		35 日 2 コース	小児急性リンパ性白血病
	デカドロン (10 歳未満)	デキサメタゾン	5-1.25 mg/m <sup>2</sup>		内服		d15-23			
	デカドロン (10 歳以上)	デキサメタゾン	10 mg/m <sup>2</sup>		内服		d1-7,15-21			

	オンコビン	ビンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>		静注		d1,8		
	テラルビシン	テラルビシン	25 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 1 時間		d1,8		
	ロイナーゼ	L-アスパラギナーゼ	10,000 U/m <sup>2</sup>		筋注		d1,4,8,11		
	エンドキサン	シクロホスファミド	500 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 1 時間		d15		
	キロサイド	シタラビン	75 mg/m <sup>2</sup>		静注		d17-20,24-27		
	ロイケリン	メルカプトプリン	60 mg/m <sup>2</sup> /day		経口 1 日 1 回 眠前		d15-28		
	メトレキサート	メトレキサート	1 歳 8mg	2 歳 10mg	3 歳以上 12mg	髄注	d17,24		
	キロサイド	シタラビン	20mg	26mg	30mg				
	プレドニン	プレドニゾロン	6mg	8mg	10mg				
ALL-B12 Ⅲ+L	デカドロン (10 歳未満)	デキサメタゾン	10 mg/m <sup>2</sup>		内服		d1-14	35 日 3 コース	小児急性リンパ性白血病
	デカドロン (10 歳未満)	デキサメタゾン	5-1.25 mg/m <sup>2</sup>		内服		d15-23		
	デカドロン (10 歳以上)	デキサメタゾン	10 mg/m <sup>2</sup>		内服		d1-7,15-21		
	オンコビン	ビンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>		静注		d1,8		
	テラルビシン	テラルビシン	25 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 1 時間		d1,8		
	ロイナーゼ	L-アスパラギナーゼ	10,000 U/m <sup>2</sup>		筋注		d1,4,8,11,15,18,22,25		
	エンドキサン	シクロホスファミド	500 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 1 時間		d15		
	キロサイド	シタラビン	75 mg/m <sup>2</sup>		静注		d17-20,24-27		
	ロイケリン	メルカプトプリン	60 mg/m <sup>2</sup> /day		経口 1 日 1 回 眠前		d15-28		
メトレキサート	メトレキサート	1 歳 8mg	2 歳 10mg	3 歳以上 12mg	髄注	d17,24			
キロサイド	シタラビン	20mg	26mg	30mg					
プレドニン	プレドニゾロン	6mg	8mg	10mg					
ALL-B12 Ⅲ+VL	デカドロン (10 歳未満)	デキサメタゾン	10 mg/m <sup>2</sup>		内服		d1-14	35 日 3 コース	小児急性リンパ性白血病
	デカドロン (10 歳未満)	デキサメタゾン	5-1.25 mg/m <sup>2</sup>		内服		d15-23		
	デカドロン (10 歳以上)	デキサメタゾン	10 mg/m <sup>2</sup>		内服		d1-7,15-21		

	オンコビン	ビンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>			静注		d1,8,15,22		
	テラルビシン	テラルビシン	25 mg/m <sup>2</sup>			点滴静注 1 時間		d1,8		
	ロイナーゼ	L-アスパラギナーゼ	10,000 U/m <sup>2</sup>			筋注		d1,4,8,11,15,18,22,25		
	エンドキサン	シクロホスファミド	500 mg/m <sup>2</sup>			点滴静注 1 時間		d15		
	キロサイド	シタラビン	75 mg/m <sup>2</sup>			静注		d17-20,24-27		
	ロイケリン	メルカプトプリン	60 mg/m <sup>2</sup> /day			経口 1 日 1 回 眠前		d15-28		
	メトレキセート	メトレキセート	1 歳 8mg	2 歳 10mg	3 歳以上 12mg	髄注	d17,24			
	キロサイド	シタラビン	20mg	26mg	30mg					
	プレドニン	プレドニゾロン	6mg	8mg	10mg					
ALL-B12 HR3	デカドロン	デキサメタゾン	20 mg/m <sup>2</sup>			内服		d1-5	14 日	小児急性リンパ性白血病
	キロサイド	シタラビン	2,000 mg/m <sup>2</sup>			点滴静注 3 時間		d1,2		
	ベプシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>			点滴静注 1 時間		d3-5		
	ロイナーゼ	L-アスパラギナーゼ	25,000 U/m <sup>2</sup>			筋注		d6,11		
	メトレキセート	メトレキセート	1 歳 8mg	2 歳 10mg	3 歳以上 12mg	髄注	d5			
	キロサイド	シタラビン	20mg	26mg	30mg					
	プレドニン	プレドニゾロン	6mg	8mg	10mg					
ALL-B12 HR2	デカドロン	デキサメタゾン	20 mg/m <sup>2</sup>			内服		d1-5	14 日	小児急性リンパ性白血病
	フィルデシン	ビンデシン	3 mg/m <sup>2</sup>			静注		d1,6		
	メトレキセート	メトレキセート	500 mg/m <sup>2</sup>			点滴静注 0.5 時間		d1		
	メトレキセート	メトレキセート	4,500 mg/m <sup>2</sup>			点滴静注 23.5 時間		d1		
	イホマイド	イホスファミド	800 mg/m <sup>2</sup>			点滴静注 1 時間		d2-4		
	ダウノマイシン	ダウノルビシン	30 mg/m <sup>2</sup>			点滴静注 24 時間		d5		
	ロイナーゼ	L-アスパラギナーゼ	25,000 U/m <sup>2</sup>			筋注		d6,11		
	メトレキセート	メトレキセート	1 歳 8mg	2 歳 10mg	3 歳以上 12mg	髄注	d1			
	キロサイド	シタラビン	20mg	26mg	30mg					

	プレドニン	プレドニゾン	6mg	8mg	10mg				
ALL-B12 HR1	デカドロン	デキサメタゾン	20 mg/m <sup>2</sup>		内服		d1-5		
	オンコビン	ビンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>		静注		d1,6		
	メトトレキセート	メトトレキサート	500 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 0.5 時間		d1		
	メトトレキセート	メトトレキサート	4,500 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 23.5 時間		d1		
	キロサイド	シタラビン	2,000 mg/m <sup>2</sup> × 2		点滴静注 3 時間		d5		
	エンドキサシ	シクロホスファミド	200 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 1 時間		d2-4		
	ロイナーゼ	L-アスパラギナーゼ	25,000 U/m <sup>2</sup>		筋注		d6,11		
	メトトレキセート	メトトレキサート	1 歳 8mg	2 歳 10mg	3 歳以上 12mg	髄注	d1		
	キロサイド	シタラビン	20mg	26mg	30mg				
	プレドニン	プレドニゾン	6mg	8mg	10mg				
ALL-B12 IM+VD	メトトレキセート	メトトレキサート	20 mg/m <sup>2</sup>		内服		d1,8,15,22,29,36,43,50		
	ロイケリン	メルカプトプリン	50 mg/m <sup>2</sup>		内服		d1-56		
	オンコビン	ビンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>		静注		d1, 29		
	デカドロン	デキサメタゾン	6 mg/m <sup>2</sup>		内服		d1-5, 29-33		
ALL-B12 TIT	メトトレキセート	メトトレキサート	1 歳 8mg	2 歳 10mg	3 歳以上 12mg	髄注	d1		
	キロサイド	シタラビン	20mg	26mg	30mg				
	プレドニン	プレドニゾン	6mg	8mg	10mg				
VLPA	アドリアシン	ドキソルビシン	25 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 1 時間		d8,15,22		
	オンコビン	ビンクリスチン	2 mg/m <sup>2</sup>		静注		d8,15,22,29		
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	2000 U/m <sup>2</sup>		筋注		d9,11,13,16,18,20, 23,25,27,30,32,34		
	プレドニン	プレドニゾン	60→30→15mg/m <sup>2</sup>		経口または静注		d1-28 (60 mg/m <sup>2</sup> ) d29-31 (30 mg/m <sup>2</sup> ) d32-35 (15 mg/m <sup>2</sup> )		
	TIT (髄注)						d1		
VLPAC	アドリアシン	ドキソルビシン	25 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 1 時間		d8,15,22		
	オンコビン	ビンクリスチン	2 mg/m <sup>2</sup>		静注		d8,15,22,29		
							14 日	小児急性リンパ性白血病	
							70 日	小児急性リンパ性白血病	
							—	小児急性リンパ性白血病	
							42 日	小児急性リンパ性白血病	
							42 日	小児急性リンパ性白血病	

	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	2000 U/m <sup>2</sup>	筋注	d9,11,13,16,18,20, 23,25,27,30,32,34		
	エンドキサン	シクロホスファミド	1200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d8		
	プレドニン	プレドニゾロン	60→30→15mg/m <sup>2</sup>	経口または静注	d1-28 (60 mg/m <sup>2</sup> ) d29-31 (30 mg/m <sup>2</sup> ) d32-35 (15 mg/m <sup>2</sup> )		
	TIT (髄注)				d1		
A-block (ALL2004)	オンコビン	ビンクリスチン	2 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1	14 日	小児急性リンパ性白血病
	プレドニン	プレドニゾロン	120 mg/m <sup>2</sup> /day	経口 1 日 3 回	d1-5		
	ロイケリン	メルカプトプリン	250 mg/m <sup>2</sup> /day	経口 1 日 2 回	d1-5		
AA-block (ALL2004)	テラルピシン	ピラルピシン	20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1	14 日	小児急性リンパ性白血病
	オンコビン	ビンクリスチン	2 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1		
	プレドニン	プレドニゾロン	120 mg/m <sup>2</sup> /day	経口 1 日 3 回	d1-5		
	ロイケリン	メルカプトプリン	250 mg/m <sup>2</sup> /day	経口 1 日 2 回	d1-5		
AA-block+weekly L-asp (ALL2004)	テラルピシン	ピラルピシン	20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1	14 日	小児急性リンパ性白血病
	オンコビン	ビンクリスチン	2 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1		
	プレドニン	プレドニゾロン	120 mg/m <sup>2</sup> /day	経口 1 日 3 回	d1-5		
	ロイケリン	メルカプトプリン	250 mg/m <sup>2</sup> /day	経口 1 日 2 回	d1-5		
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	6000 U/m <sup>2</sup>	筋注	d1,d8		
As-block (ALL2004)	オンコビン	ビンクリスチン	2 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1	14 日	小児急性リンパ性白血病
	プレドニン	プレドニゾロン	80 mg/m <sup>2</sup> /day	経口 1 日 3 回	d1-5		
	ロイケリン	メルカプトプリン	250 mg/m <sup>2</sup> /day	経口 1 日 2 回	d1-5		
B-block (ALL2004)	メソトレキセート	メソトレキセート	225 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1	14 日	小児急性リンパ性白血病
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	2000 U/m <sup>2</sup>	筋注	d1		
BH-block (ALL2004)	メソトレキセート	メソトレキセート	3000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1	7 日	小児急性リンパ性白血病
BI-block+weekly L-asp (ALL2004)	メソトレキセート	メソトレキセート	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1	14 日	小児急性リンパ性白血病
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	6000 U/m <sup>2</sup>	筋注	d1,d8		
Bs-block (ALL2004)	メソトレキセート	メソトレキセート	225 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1	14 日	小児急性リンパ性白血病
C-block (ALL2004)	エンドキサン	シクロホスファミド	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1	14 日	小児急性リンパ性白血病
	キロサイド	シタラビン	50 mg/m <sup>2</sup> × 2	静注	d1-4		



	ロイケリン	メルカプトプリン	125 mg/m <sup>2</sup> /day			経口 1日2回	d1-5		
C-block+weekly L-asp (ALL2004)	エンドキサン	シクロホスファミド	400 mg/m <sup>2</sup>			点滴静注 1時間	d1	14日	小児急性リンパ性白血病
	キロサイド	シタラビン	50 mg/m <sup>2</sup> × 2			静注	d1-4		
	ロイケリン	メルカプトプリン	125 mg/m <sup>2</sup> /day			経口 1日2回	d1-5		
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	6000 U/m <sup>2</sup>			筋注	d1,8		
CHs-block (HHR ALL2004)	エンドキサン	シクロホスファミド	500 mg/m <sup>2</sup>			点滴静注 1時間	d1,15	35日	小児急性リンパ性白血病
	キロサイド	シタラビン	75 mg/m <sup>2</sup> × 2			静注	d1-4,d15-18		
	ロイケリン	メルカプトプリン	30 mg/m <sup>2</sup> /day			経口 1日2回	d1-28		
TIT (髄注) (ALL2004)	メトトレキサート	メトトレキサート	1歳 8mg	2歳 10mg	3歳 12mg	髄注	d1,8,15	小児急性リンパ性白血病	
	キロサイド	シタラビン	20mg	25mg	30mg				
	ハイドロコトソン	ヒドロコルチゾン	15mg	20mg	25mg				
ECL-block (ALL2004)	エトポシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>			点滴静注 3時間	d1-4	14日	小児急性リンパ性白血病
	キロサイド	シタラビン	2000 mg/m <sup>2</sup> × 2			点滴静注 3時間	d1-4		
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	6000 U/m <sup>2</sup>			筋注	d5		
VLDDC (ALL2004)	エンドキサン	シクロホスファミド	1200 mg/m <sup>2</sup>			点滴静注 1時間	d1	28日	小児急性リンパ性白血病
	オンコビン	ビンクリスチン	2 mg/m <sup>2</sup>			静注	d1,8,15		
	ダウノマイシン	ダイノルビシン	40 mg/m <sup>2</sup>			点滴静注 1時間	d1,8,15		
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	6000 U/m <sup>2</sup>			筋注	d9,11,13,16,18,20		
	デキサート	デキサメタゾン	10→5→2.5 mg/m <sup>2</sup>			経口または静注	d1-14: 10mg/m <sup>2</sup> d15-17: 5mg/m <sup>2</sup> d18-21: 2.5mg/m <sup>2</sup>		
protocol III (AIEOP-BFM ALL 2000)	デキサート	デキサメタゾン	10 mg/m <sup>2</sup>			経口	d1-15	42日	B 前駆細胞性急性リンパ性白血病
	オンコビン	ビンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>			静注	d1,8		
	アドリアシン	ドキシソルビシン	30 mg/m <sup>2</sup>			点滴静注 1時間	d1,8		
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	10000 U/m <sup>2</sup>			点滴静注 1時間	d1,4,8,11		
	エンドキサン	シクロホスファミド	500 mg/m <sup>2</sup>			点滴静注 1時間	d15		
	キロサイド	シタラビン	75 mg/m <sup>2</sup>			静注	d17-20,24-27		
	ロイケリン	メルカプトプリン	60 mg/m <sup>2</sup>			経口	d15-28		
	メトトレキサート	メトトレキサート	1歳 8mg	2歳 10mg	3歳 12mg	髄注	d17, 24		

ALL T11 先行治療相	メソトレキセート	メトトレキサート	1歳未満 6mg	1歳 8mg	2歳 10mg	3歳以上 12mg	髄注	d1	7日	小児急性リンパ性白血病
	プレドニン	プレドニゾン	15 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup> 45 mg/m <sup>2</sup> 60 mg/m <sup>2</sup>	経口		d1 d2 d3 d4-7				
ALL T11 I <sub>A</sub>	デカドロン	デキサメタゾン	10歳未満 10 mg/m <sup>2</sup>	経口		d8-28			35日	小児急性リンパ性白血病
	デカドロン	デキサメタゾン	10歳未満 10 mg/m <sup>2</sup>	経口		d29-37				
	デカドロン	デキサメタゾン	10歳以上 10 mg/m <sup>2</sup>	経口		d8-14,22-28				
	オンコビン	ピンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>	静注		d8, 15, 22, 29				
	ダウノマイシン	ダイノルビシン	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間		d8, 15, 22, 29				
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	5000 U/m <sup>2</sup>	筋注		d12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33				
	メソトレキセート	メトトレキサート	<1歳 6mg	1歳 8mg	2歳 10mg	3歳 12mg	髄注	d12,33, (18),(27)		
	キロサイド	シタラビン	16mg	20mg	26mg	30mg				
	プレドニン	プレドニゾン	4mg	6mg	8mg	10mg				
ALL T11 I <sub>B</sub>	エンドキサン	シクロホスファミド	1000 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 1時間		d1, 29		35日	小児急性リンパ性白血病
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	5000 U/m <sup>2</sup>		筋注		d3,6,10,13,17,20,24,27			
	キロサイド	シタラビン	75 mg/m <sup>2</sup> × 2		静注		d3-6,10-13,17-20,24-27			
	ロイケリン	メルカプトプリン	60 mg/m <sup>2</sup> /day		経口		d1-28			
	メソトレキセート	メトトレキサート	<1歳 6mg	1歳 8mg	2歳 10mg	3歳 12mg	髄注	d10, 24		
	キロサイド	シタラビン	16mg	20mg	26mg	30mg				
	プレドニン	プレドニゾン	4mg	6mg	8mg	10mg				
ALL T11 M+L	メソトレキセート	メトトレキサート	500 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 0.5時間		d8, 22, 36, 50		56日	T細胞性急性リンパ性白血病
	メソトレキセート	メトトレキサート	4,500 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 23.5時間		d8, 22, 36, 50			
	ロイケリン	メルカプトプリン	25 mg/m <sup>2</sup> /day		経口		d 1-56			
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	12,500 U/m <sup>2</sup>		筋注		d 10, 24, 38, 52			
	メソトレキセート	メトトレキサート	<1歳 6mg	1歳 8mg	2歳 10mg	3歳 12mg	髄注	d8, 22, 36, 50		
	キロサイド	シタラビン	16mg	20mg	26mg	30mg				

	プレドニン	プレドニゾン	4mg	6mg	8mg	10mg				
ALL T11 II <sub>A</sub> +L	デカドロン	デキサメタゾン	10歳未満 10 mg/m <sup>2</sup>		経口		d1-21		35日	小児急性リンパ性白血病
	デカドロン	デキサメタゾン	5-1.25 mg/m <sup>2</sup>		経口		d22-30			
	デカドロン	デキサメタゾン	10歳以上 10 mg/m <sup>2</sup>		経口		d1-7, 15-21			
	オンコビン	ビンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>		静注		d8, 15, 22, 29			
	アドリアシン	アドリアマイシン	30 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 1時間		d8, 15, 22, 29			
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	10000 U/m <sup>2</sup>		筋注		d8,11,15,18			
	メトレキセート	メトレキサート	<1歳 6mg	1歳 8mg	2歳 10mg	3歳 12mg	髄注	d1, 18		
	シタラビン	シタラビン	16mg	20mg	26mg	30mg				
	プレドニン	プレドニゾン	4mg	6mg	8mg	10mg				
ALL T11 II <sub>B</sub> +L	エンドキサン	シクロホスファミド	1000 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 1時間		d1		28日	小児急性リンパ性白血病
	ロイナーゼ	アスパラギナーゼ	10000 U/m <sup>2</sup>		筋注		d1,4,8,11			
	シタラビン	シタラビン	75 mg/m <sup>2</sup>		静注		d3-6,10-13			
	ロイケリン	メルカプトプリン	60 mg/m <sup>2</sup> /day		経口		d1-14			
	メトレキセート	メトレキサート	<1歳 6mg	1歳 8mg	2歳 10mg	3歳 12mg	髄注	d3, 10		
	シタラビン	シタラビン	16mg	20mg	26mg	30mg				
	プレドニン	プレドニゾン	4mg	6mg	8mg	10mg				
ALL-R08 R1	デカドロン	デキサメタゾン	20 mg/m <sup>2</sup>		経口 1日 2-3回		d1-5		21日 4コース	再発 ALL (初発 18歳未満、再発 20歳未満) (成熟 B 細胞性白血病、Ph+ALL、 MLL+乳児白血病を除く)
	デカドロン	デキサメタゾン	10 mg/m <sup>2</sup>		経口 1日 2-3回		d6			
	ロイケリン	メルカプトプリン	100 mg/m <sup>2</sup> /day		経口 1日 1回 眠前		d1-5			
	オンコビン	ビンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>		静注		d1,6			
	メトレキセート	メトレキサート	100 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 30分		d1			
	メトレキセート	メトレキサート	900 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 35.5時間		d1			
	キロサイド	シタラビン	2 g/m <sup>2</sup> × 2		点滴静注 3時間		d5			
	ロイナーゼ	L-アスパラギナーゼ	10,000 U/m <sup>2</sup>		点滴静注 6時間		d6			
	メトレキセート	メトレキサート	1歳 8mg	2歳 10mg	3歳 12mg	髄注		d1		

	キロサイド	シタラビン	20mg	26mg	30mg				
	プレドニン	プレドニゾン	6mg	8mg	10mg				

[小児科へ戻る](#)

[Topへ戻る](#)

## 小児 AML

レジメン名	商品名	一般名	投与量		投与時間		投与日		1クール	適用
ECM (AML-05)	エトポシド	エトポシド	150 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 2 時間		d1-5		28 日	小児急性骨髄性白血病
	キロサイド	シタラビン	200 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 12 時間		d6-12			
	ノバントロン	ミトキサントロン	5 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 1 時間		d6-10			
	TIT (髄注)*	—	—		—		d6			
HCM (AML-05)	キロサイド	シタラビン	2000 mg/m <sup>2</sup> × 2		点滴静注 3 時間		d1-5		28 日	小児急性骨髄性白血病
	ノバントロン	ミトキサントロン	5 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 1 時間		d1-3			
	TIT (髄注)*	—	—		—		d1			
HCEI (AML-05)	キロサイド	シタラビン	3000 mg/m <sup>2</sup> × 2		点滴静注 3 時間		d1-3		28 日	小児急性骨髄性白血病
	エトポシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 2 時間		d1-5			
	イダマイシン	イダルビシン	10 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 1 時間		d1			
	TIT (髄注)*	—	—		—		d1			
*TIT (髄注) (AML-05)			3 カ月未満	1 歳未満	1 歳	2 歳	3 歳以上	髄注	—	小児急性骨髄性白血病
	メントレキセート	メトトレキサート	3 mg	6 mg	8 mg	10 mg	12 mg			
	キロサイド	シタラビン	6 mg	15 mg	20 mg	25 mg	30 mg			
	ハイドロコートン	ヒドロコルチゾン	10 mg	10 mg	15 mg	20 mg	25 mg			
IDA-FLAG (AML-R11(2 歳以上))	ノイトロジン	レノグラスチム	5µg/kg		点滴静注 1 時間		d1-6		28 日	小児急性骨髄性白血病
	フルダラ	フルダラビン	30mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 30 分		d2-6			
	キロサイド	シタラビン	2000mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 3 時間		d2-6			
	イダマイシン	イダルビシン	10mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 1 時間		d2-4			

			2歳	3歳以上					
	メトトレキサート	メトトレキサート	10mg	12mg	髄注	d1			
	キロサイド	シタラビン	25mg	30mg					
	ハイドロコートン	ヒドロコルチゾン	20mg	25mg					
AVC1 (CNS1) (AML 9805RE)	キロサイド	シタラビン	160 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1-7		28 日	小児急性骨髄性白血病	
	テラルビシン	ピラルビシン	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d2,4				
	オンコビン	ビンクリスチン	1 mg/m <sup>2</sup>	静注	d7				
	TIT	—	—	—	d1				
AVC2 (AML 9805RE)	キロサイド	シタラビン	160 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1-5		28 日	小児急性骨髄性白血病	
	テラルビシン	ピラルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d2				
	オンコビン	ビンクリスチン	1 mg/m <sup>2</sup>	静注	d5				
	TIT	—	—	—	d1				
VVEC (AML 9805RE)	キロサイド	シタラビン	1000 mg/m <sup>2</sup> × 2	点滴静注 2 時間	d1-4		28 日	小児急性骨髄性白血病	
	エトポシド	エトポシド	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d2-4				
	オンコビン	ビンクリスチン	0.8 mg/m <sup>2</sup>	静注	d7				
	フィルデシン	ビンデシン	3 mg/m <sup>2</sup>	静注	d9				
MC (AML 9805RE)	キロサイド	シタラビン	160 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1-5		28 日	小児急性骨髄性白血病	
	ノバントロン	ミトキサントロン	5 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d2-4				
TIT (AML9805RE)			3カ月-1歳未満	1歳	2歳	3歳以上	髄注	—	小児急性骨髄性白血病
	メトトレキサート	メトトレキサート	5mg	8mg	10mg	12mg			
	キロサイド	シタラビン	10mg	20mg	30mg	40mg			
	ハイドロコートン	ヒドロコルチゾン	10mg	15mg	20mg	25mg			
GET (AML-D05)	テラルビシン	ピラルビシン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1,2		28 日	小児急性骨髄性白血病 ダウン症	
	エトポシド	エトポシド	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d3-5				
	キロサイド	シタラビン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1-7				
CT (AML-D05)	テラルビシン	ピラルビシン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1,2		28 日	小児急性骨髄性白血病 ダウン症	
	キロサイド	シタラビン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1-7				
GCLAC (寛解導入) 1-2 コース	クロファラビン	エポルトラ	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1-5		21 日	小児急性骨髄性白血病	
	キロサイド	シタラビン	2000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1-5				

GCLAC (寛解後) 3コースまで	クロファラビン	エボルトラ	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1-4	21 日	小児急性骨髄性白血病
	キロサイド	シタラビン	2000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1-4		
AML-12 ECM	ベプシド	エトポシド	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1-5	28 日	小児急性骨髄性白血病
	キロサイド	シタラビン	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 12 時間	d6-12		
	ノバントロン	ミトキサントロン	5 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d6-10		
	TIT (髄注)*	—	—	—	d1		
AML-12 HD-ECM	ベプシド	エトポシド	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d2-6	28 日	小児急性骨髄性白血病
	キロサイド	シタラビン	3g/m <sup>2</sup> X2	点滴静注 3 時間	d1, 3, 5		
	ノバントロン	ミトキサントロン	5 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d2-6		
	TIT (髄注)*	—	—	—	d1		
AML-12 HCEI	キロサイド	シタラビン	3g/m <sup>2</sup> X2	点滴静注 3 時間	d1-3	28 日	小児急性骨髄性白血病
	ベプシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1-5		
	イダマイシン	イダルビシン	10mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1		
	TIT (髄注)*	—	—	—	d1		

[小児科へ戻る](#)

[Top へ戻る](#)

## 小児 NHL

B-NHL 03 P2-3	プレドニン	プレドニゾン	30 mg/m <sup>2</sup>		経口			d1-3		7 日	小児成熟 B 細胞性腫瘍
	プレドニン	プレドニゾン	60 mg/m <sup>2</sup>		経口			d4-7			
	オンコピン	ビンクリスチン	1 mg/m <sup>2</sup>		静注			d3			
	エンドキサン	シクロホスファミド	150 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 15 分			d4-6			
	メトトレキサート	メトトレキサート	3 ヵ月未満 3mg	1 歳未満 6mg	1 歳 8mg	2 歳 10mg	3 歳 12mg	髄注	d1		
	ハイドロコートン	ヒドロコルチゾン	10mg	10mg	15mg	20mg	25mg	髄注	d1		
B-NHL 03 P4	プレドニン	プレドニゾン	30 mg/m <sup>2</sup>		経口			d1-3		7 日	小児成熟 B 細胞性腫瘍
	プレドニン	プレドニゾン	60 mg/m <sup>2</sup>		経口			d4-7			

	オンコビン	ビンクリスチン	1 mg/m <sup>2</sup>		静注		d3		
	エンドキサン	シクロホスファミド	150 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 15 分		d4-6		
	メトトレキサート	メトトレキサート	3 カ月未満 3mg	1 歳未満 6mg	1 歳 8mg	2 歳 10mg	3 歳以上 12mg	髄注	d1,(4)
	ハイドロコートン	ヒドロコルチゾン	10mg	10mg	15mg	20mg	25mg	髄注	d1,(4)
	キロサイド	シタラビン	6mg	15mg	20mg	25mg	30mg	髄注	(d4)
B-NHL 03 3B	メトトレキサート	メトトレキサート	500mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 6 時間		day 1		
	キロサイド	シタラビン	150mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 24 時間		day 1-5		
	ベブシド	エトボシド	100mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 2 時間		day 3-5		
	メトトレキサート	メトトレキサート	3 カ月未満 3mg	1 歳未満 6mg	1 歳 8mg	2 歳 10mg	3 歳以上 12mg	髄注	d1
	ハイドロコートン	ヒドロコルチゾン	10mg	10mg	15mg	20mg	25mg	髄注	d1
	キロサイド	シタラビン	6mg	15mg	20mg	25mg	30mg	髄注	d1
B-NHL 03 4A1	デカドロン	デキサメタゾン	10mg/m <sup>2</sup>		内服 分 3		day 1-7		
	メトトレキサート	メトトレキサート	5g/m <sup>2</sup>		点滴静注 24 時間		day 1		
	オンコビン	ビンクリスチン	1.5mg/m <sup>2</sup>		静注		day 2		
	エンドキサン	シクロホスファミド	250g/m <sup>2</sup> × 2		点滴静注 30 分		day 2-4		
	テラルビシン	ピラルビシン	30mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 1 時間		day 3,4		
	メトトレキサート	メトトレキサート	3 カ月未満 3mg	1 歳未満 6mg	1 歳 8mg	2 歳 10mg	3 歳以上 12mg	髄注	d1,(5),8
	ハイドロコートン	ヒドロコルチゾン	10mg	10mg	15mg	20mg	25mg	髄注	d1,(5),8
	キロサイド	シタラビン	6mg	15mg	20mg	25mg	30mg	髄注	d1,(5),8
B-NHL 03 4A2	デカドロン	デキサメタゾン	10mg/m <sup>2</sup>		内服 分 3		day 1-7		
	メトトレキサート	メトトレキサート	5g/m <sup>2</sup>		点滴静注 24 時間		day 1		
	オンコビン	ビンクリスチン	1.5mg/m <sup>2</sup>		静注		day 2		
	エンドキサン	シクロホスファミド	1g/m <sup>2</sup>		点滴静注 1 時間		day 4,5		
	テラルビシン	ピラルビシン	30mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 1 時間		day 4,5		

		メトトレキサート	メトトレキサート	3カ月未満 3mg	1歳未満 6mg	1歳 8mg	2歳 10mg	3歳以上 12mg	髄注	d1,8			
		ハイドロコートン	ヒドロコルチゾン	10mg	10mg	15mg	20mg	25mg	髄注	d1,8			
		キロサイド	シタラビン	6mg	15mg	20mg	25mg	30mg	髄注	d1,8			
B-NHL 03 4B		デカドロン	デキサメタゾン	10mg/m <sup>2</sup>		1日3回内服		day 1-5				14日 2コース	小児成熟B細胞性腫瘍
		キロサイド	シタラビン	2g/m <sup>2</sup> × 2回		点滴静注 3時間		day 2-4					
		ペプシド	エトポシド	150mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 2時間		day 2-5					
		オンコピン	ピンクリスチン	1.5mg/m <sup>2</sup>		静注		day 1					
		メトトレキサート	メトトレキサート	3カ月未満 3mg	1歳未満 6mg	1歳 8mg	2歳 10mg	3歳以上 12mg	髄注	d1,8			
		ハイドロコートン	ヒドロコルチゾン	10mg	10mg	15mg	20mg	25mg	髄注	d1,8			
		キロサイド	シタラビン	6mg	15mg	20mg	25mg	30mg	髄注	d8			
(限)R-hyperC-VAD /MA 交替療法	(限)R-hyperC-VAD cycle1,3,5,7	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 2-6時間		day 1,11				21日	バーキットリンパ腫 B-ALL
		エンドキサン	シクロホスファミド	300 mg/m <sup>2</sup> × 2		点滴静注 2hr		day 1-3					
		オンコピン	ピンクリスチン	1.4 mg/m <sup>2</sup> (max 2mg)		静注		day 4,11					
		アドリアシン	ドキシソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 24hr		day 4					
		デキサート	デキサメタゾン	33 mg/body		点滴静注 30min		day 1-4, day 11-14					
	(限)R-MA cycle2,4,6,8	メトトレキサート	メトトレキサート	1g/m <sup>2</sup>		点滴静注 24時間		day 1				21日	バーキットリンパ腫 B-ALL
		キロサイド	シタラビン	3g/m <sup>2</sup> × 2		点滴静注 3時間		day 2,3					
		リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>		点滴静注 2-6時間		day 2,8					

[小児科へ戻る](#)

[Topへ戻る](#)

## その他

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
2-CdA	ロイスタチン	クラドリビン	5 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24時間	d1-5	28日	再発ランゲルハンス細胞組織球症



MEC	アルケラン	メルファラン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d-9,-8	10 日	小児神経芽腫 強化療法
	ベプシド	エトポシド	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d-7,-6,-5,-4		
	カルボプラチン	カルボプラチン	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 22 時間	d-7,-6,-5,-4		
regimen 98new A1	エンドキサン	シクロホスファミド	1200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1	28 日	Ⅲ期神経芽腫
	オンコビン	ピンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1		
	テラルビシン	ピラルビシン	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d3		
	ランダ	シスプラチン	18 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1-5		
regimenA	エンドキサン	シクロホスファミド	1200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1,2	28 日	Ⅳ期神経芽腫
	オンコビン	ピンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1		
	テラルビシン	ピラルビシン	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d3		
	ランダ	シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1-5		
regimenB	イホマイド	イホスファミド	3000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1-3	28 日	Ⅳ期神経芽腫
	エトポシド	エトポシド	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d1-3		
	カルボプラチン	カルボプラチン	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3 時間	d4		
RegimenB-① OS-94	イホマイド	イホスファミド	3000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 6 時間	d1-4	28 日	骨肉腫
	エトポシド	エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1-4		
RegimenB-② OS-94	ランダ	シスプラチン	120 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 6 時間	d1	21 日	骨肉腫
	アドリアシン	ドキシソルビシン	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d2-3		
術前 HD-MTX OS-94	メソトレキセート	メソトレキセート	12g/m <sup>2</sup>	点滴静注 6 時間	d1	7 日	骨肉腫
AP block JCOG 0905	ランダ	シスプラチン	120 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 6 時間	d1	21 日	骨肉腫
	アドリアシン	ドキシソルビシン	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1-2		

M block JCOG 0905	メソトレキセート	メソトレキサート	12g/m <sup>2</sup> (19歳以下) 10g/m <sup>2</sup> (20歳以上)	点滴静注 6 時間	d1		7 日	骨肉腫	
IF block JCOG 0905	イホマイド	イホスファミド	3000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 6 時間	d1-5		21 日	骨肉腫	
EE-4A	コスメゲン	アクチノマイシン D	0.045 mg/kg	静注	d1,22,43,64,85,106,127		127 日	Wilms 腫瘍	
	オンコビン	ピンクリスチン	0.05 mg/kg	静注	d8,15,22,29,36,43,50,57,64,71				
	オンコビン	ピンクリスチン	0.067 mg/kg	静注	d85,106,127				
テモダール単独	テモダール	テモゾロミド	(1クール目) 150 mg/m <sup>2</sup> (2クール目~) 200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 90 分	d1-5		28 日	悪性神経膠腫	
RMS low A VAC JRS-1 LRA0401	オンコビン	ピンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>	静注	day1,8,15,22,29,36,43,50,57,85,92,99,106,113,120,127,134,141		161 日	横紋筋肉腫 (低リスク A 群)	
	コスメゲン	アクチノマイシン D	0.045 mg/kg	静注	day1 ,22,43,64,85,106,127,148				
	エンドキサン	シクロホスファミド	1200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	day1 ,22,43,64,85,106,127,148				
RMS low B VAC JRS-1 LRB0402			1 歳未満	1 歳以上 3 歳未満	3 歳以上			21 日	横紋筋肉腫 (低リスク B 群)
	オンコビン	ピンクリスチン	0.025 mg/Kg	0.05 mg/Kg	1.5 mg/m2	静注(1分以上)	day1,8,15		
	コスメゲン	アクチノマイシン D	0.025 mg/kg	0.045 mg/Kg	0.045 mg/Kg	静注(1分前後)	day1		
	エンドキサン	シクロホスファミド	36 mg/Kg	73 mg/Kg	2.2 g/m2	点滴静注 30 分	day1		
RMS iVAC JRS-1 IR0401			1 歳未満	1 歳以上 3 歳未満	3 歳以上			21 日 (9 コース)	横紋筋肉腫 (中間リスク群)
	オンコビン	ピンクリスチン	0.025 mg/Kg	0.05 mg/Kg	1.5 mg/m2	静注(1分以上)	day1,8,15		
	コスメゲン	アクチノマイシン D	0.025 mg/kg	0.045 mg/Kg	0.045 mg/Kg	静注(1分前後)	day1		
	エンドキサン	シクロホスファミド	36 mg/Kg	73 mg/Kg	2.2 g/m2	点滴静注 30 分	day1		
HSI (Head Start Induction)	ランダ	シスプラチン	3.5 mg/kg	点滴静注 3 時間	d1		28 日	非定型奇形腫様/ラブドイド腫瘍	
	ベプシド	エトボシド	4 mg/kg × 2	点滴静注 3 時間	d2,3				

	エンドキサン	シクロホスファミド	65 mg/kg	点滴静注 1 時間	d2,3		
	メソトレキセート	メトトレキサート	400 mg/kg	点滴静注 4-6 時間	d4		
	オンコビン	ビンクリスチン	0.05 mg/kg	静注	d1,8,15		
R-ICE	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	d1,3	21 日	CD20 陽性非ホジキンリンパ腫
	イホマイド	イホスファミド	900 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d3-5		
	ペプシド	エトポシド	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d3-5		
	カルボプラチン	カルボプラチン	635mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d3		
ICE	ランダ	シスプラチン	20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1-5	28 日	小児脳腫瘍
	イホマイド	イホスファミド	900 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1-5		
	ペプシド	エトポシド	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1-5		
ICE(再発難治肉腫)	カルボプラチン	カルボプラチン	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1,2	21 日	小児 再発難治肉腫
	イホマイド	イホスファミド	1800 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1-5		
	ペプシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1-5		
Topo + L-PAM + CY	エンドキサン	シクロホスファミド	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1-3		小児固形腫瘍、脳腫瘍の移植前処置
	アルケラン	メルファラン	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d4,5		
	ハイカムチン	トポテカン	3.5 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30 分	d1-5		
Topotecan 髄注	ハイカムチン	トポテカン	0.4 mg/body	髄腔内注入 30 分	週 2 回を 4 週間		悪性腫瘍に伴う髄膜炎
IVCY (小児)	エンドキサン	シクロホスファミド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1	28 日	治療抵抗性リウマチ性疾患
VDC	オンコビン	ビンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1	21 日	Ewing 肉腫ファミリー腫瘍 (VDC/IE; スケジュール確認要)
	アドリアシン	ドキシソルピシン	37.5 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1,2		
	エンドキサン	シクロホスファミド	1200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1		
IE	イホマイド	イホスファミド	1800 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1-5	21 日	Ewing 肉腫ファミリー腫瘍

	ベプシド	エトボシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1-5		(VDC/IE;スケジュール確認要)
VC 4コース	オンコビン	ピンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1	21 日	Ewing 肉腫 VC
	エンドキサン	シクロホスファミド	1200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1		
weekly VCR	オンコビン	ピンクリスチン	1.5 mg/m <sup>2</sup>	静注	d1	7 日	髄芽腫
(限) CBDCA+ADR	カルボプラチン	カルボプラチン	400 mg/m <sup>2</sup>	2 時間	d1	21 日	小児骨肉腫
	アドリアシン	ドキシソルビシン	30 mg/m <sup>2</sup>	24 時間	d1-2		
HR-03							横紋筋肉腫
LCH-12 プロトコール							小児ランゲルハンス細胞組織球症
NWTS-5							CCSK(BW ≤ 30Kg)
TOPO/CTX	ハイカムチン	ノギテカン	0.75mg/m <sup>2</sup>	30 分	day 1-5	21-28 日	再発・難治固形腫瘍
	エンドキサン	シクロホスファミド	250mg/m <sup>2</sup>	1 時間	day 1-5		
VNR+CPA	ロゼウス	ビノレルビン	25mg/m <sup>2</sup>	全開	day 1,8,15	28 日	横紋筋肉腫
	エンドキサン	シクロホスファミド	25mg/m <sup>2</sup>	内服	day 1-28		

[小児科へ戻る](#)

[Top へ戻る](#)

[Top へ戻る](#)

## 腎臓・リウマチ・膠原病内科

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
IVCY (ELNT)	エンドキサン	シクロホスファミド	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2hr	d1	14 日	難治性リウマチ性疾患(SLE,全身性血管炎、多発性筋炎、皮膚筋炎、強皮症、

							混合性結合組織病など)
RXM(小児 NS)	リツキサン	リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup> Max 500mg/body	点滴静注 4~8hr	d1,8,15,22	28 日	難治性ネフローゼ症候群(小児期発症)

[Top へ戻る](#)

## 整形外科

### 骨軟部肉腫

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
IFM+DXR	アドリアシン	ドキシソルビシン	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2 時間	d1,2	21 日	骨軟部肉腫
	イホマイド	イホスファミド	2 g/m <sup>2</sup>	点滴静注 4 時間	d1-5		
HAL	ハラヴェン	エリブリン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 5 分	d1,8	21 日	悪性軟部腫瘍
Trabectedin	ヨンデリス	トラベクテジン	1.2 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 24 時間	d1	21 日	進行悪性軟部腫瘍
iVAC	オンコピン	ピンクリスチン	1.5mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day 1,8,15	21 日	横紋筋肉腫
	コスメゲン	アクチノマイシン	0.045mg/Kg	急速静注	day 1		
	エンドキサン	シクロホスファミド	2.2g/m <sup>2</sup>	点滴 60 分	day 1		

[Top へ戻る](#)

## 皮膚科

### 乳房外パジェット病

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
DTX(70)	ドセタキセル	ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1	28 日	乳房外 Paget 病
DTX(30) weekly	ドセタキセル	ドセタキセル	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1 時間	d1,8,15	28 日	乳房外 Paget 病
FECOM (I)	5-FU	5-フルオロウラシル	350 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 4 時間	d2-6	28-35 日	乳房外 Paget 病

	ファルモルビシン	エピルビシン	40 mg/m <sup>2</sup>	静注 5分	d1		
	カルボプラチン	カルボプラチン	300 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 4時間	d2		
	オンコビン	ビンクリスチン	0.7 mg/m <sup>2</sup>	静注 5分	d1		
	マイトマイシン	マイトマイシン C	3.5 mg/m <sup>2</sup>	静注 5分	d1		

## 悪性黒色腫

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
Nivolumab	オプジーボ	ニボルマブ	240mg	30分	d1	14日	悪性黒色腫
Pembrolizumab	キイトルーダ	ペンブロリズマブ	200mg/body	30分	d1	21日	悪性黒色腫
Ipilimumab(3W)	ヤーボイ	イピリムマブ	3 mg/kg	点滴静注 1時間	d1	21日	悪性黒色腫
Nivo+Ipi(3W)併用療法	オプジーボ	ニボルマブ	80mg/body (5コース目以降 240mg/kg)	30min	d1	21日 (5コース 目以降14 日)	悪性黒色腫
	ヤーボイ	イピリムマブ	3mg/kg (5コース目以降 off)	90min	d1		
DITC 単剤	ダカルバジン	ダカルバジン	250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1-5	28日	悪性黒色腫

## 有棘細胞癌

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
C' A'	カルボプラチン	カルボプラチン	AUC 5	点滴静注 4時間	d1	28日	有棘細胞癌
	ファルモルビシン	エピルビシン	30-60 mg/m <sup>2</sup>	急速静注 5分	d2		
CA(3)	ランダ	シスプラチン	20-30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3時間	d1-3	28日	有棘細胞癌
	アドリアシン	ドキシソルビシン	20-30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 30分	d1		
PEP	ペブレオ	ペプロマイシン	5mg/body/日 (2.5 mg/body×2 朝夕)	筋注	d1-5	7日	有棘細胞癌

## 血管肉腫

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
weekly PTX(80)	パクリタキセル	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1,8,15	28日	血管肉腫
monthly PTX(180-200)	パクリタキセル	パクリタキセル	180-200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 3時間	d1	28日	血管肉腫
weekly DTX(30)	ドセタキセル	ドセタキセル	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 1時間	d1,8,15	28日	血管肉腫

HAL	ハラヴェン	エリ布林	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 5分	d1,8	21日	悪性軟部肉腫
-----	-------	------	----------------------	---------	------	-----	--------

[Top へ戻る](#)

## 脳神経外科

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
TMZ+Bev+RT	テモダール	テモゾロミド	75 mg/m <sup>2</sup>	内服 1日1回	d1-42	6週	悪性神経膠腫
	アバステン	ベバシズマブ	10 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1,15,29,42		
	RT		2Gy		d1-5,d8-13, d15-19,d22-26, d29-33,d36-40		
TMZ+Bev	テモダール	テモゾロミド	150 mg/m <sup>2</sup>	内服 1日1回	d1-5	28日	悪性神経膠腫
	アバステン	ベバシズマブ	10 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1,15		
Bev(3w)	アバステン	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	21日	悪性神経膠腫
Bev(2w)	アバステン	ベバシズマブ	10 mg/kg	点滴静注 30分 (初回 90分) (2回目 60分)	d1	14日	再発悪性神経膠腫
PAV+RT	塩酸プロカルバジン	塩酸プロカルバジン	90 mg/m <sup>2</sup>	内服 1日1回	d1-14	42日	脳腫瘍
	ニドラン	ニムスチン	80 mg/m <sup>2</sup>	静注 5分以上	d1		
	オンコピン	ピンクリスチン	0.5 mg/m <sup>2</sup>	静注 5分以上	d1		
ICE(脳腫瘍)	ランダ	シスプラチン	20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1-5	28日	脳腫瘍
	イホマイド	イホスファミド	900 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1-5		
	ペプシド	エトポシド	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 2時間	d1-5		

[Top へ戻る](#)

## 放射線科

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
CDDP 肝動注	アイエーコール	シスプラチン	65mg/m <sup>2</sup>	肝動脈注入	d1	21日-42日	肝臓癌
EPIR 肝動脈化学塞栓術	ファルモルビシン	エピルビシン	30-40mg/body	肝動脈注入	d1	肝予備能が回復するまで	肝臓癌
MPT 肝動脈化学塞栓術	ミリプラ	ミリプラチン	70mg/body	肝動脈注入	d1	28日	肝臓癌
DEB-TACE	ファルモルビシン	エピルビシン	50mg/body	肝動脈注入	d1	PDまで	肝臓癌

[Top へ戻る](#)

## 眼科

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
眼内 MTX	メソトレキセート	メソトレキセート	400μg/body (寛解導入、地固め) 100μg/body (維持)	硝子体注入	週2回×4週(寛解導入) 週1回×4週(地固め) 月1回×12回(維持)	—	眼内リンパ腫

[Top へ戻る](#)

## 共通

MSI-High を有する固形癌、TMB-High を有する進行・再発の固形癌



レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
Pembrolizumab	キイトルーダ	ペンブロリズマブ	200mg/body	30分	d1	21日	固形癌

## 肝動注

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
MMC 肝動注	マイトマイシン	マイトマイシン C	2-10 mg/body	肝動注	d1	7	肝癌・ 転移性肝癌

## その他

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	適用
レミケード	レミケード	インフリキシマブ	3-10 mg/kg	点滴静注 1-2時間	d1	2週-8週	関節リウマチ クローン病 潰瘍性大腸炎 ベーチェット病による難治性網 膜ぶどう膜炎 乾癬 強直性脊椎炎
インフリキシマブ	インフリキシマ ブ	インフリキシマブ	3-10 mg/kg	点滴静注 1-2時間	d1	2週-8週	関節リウマチ クローン病 潰瘍性大腸炎
Abatacept	オレンシア	アバタセプト	500-1000 mg	点滴静注 30分	d1	2週-4週	関節リウマチ
Tocilizumab	アクテムラ	トシリズマブ	8 mg/kg	点滴静注 1時間	d1	2週-4週	関節リウマチ 若年性特発性関節炎 全身型若年性特発性関節炎 キャッスルマン病
Belimumab	ベンリスタ	ベリムマブ	10mg/kg	1時間	d1,d15,d29 以降4週お き	28日	全身性エリテマトーデス(坑核 抗体、抗 dsDNA 抗体等の自 己抗体が陽性)
Anifrolumab	サフネロー	アニフロルマブ	300mg	30分	d1	28日	全身性エリテマトーデス

[Top へ戻る](#)